

新刊秘授外科百效全書

類秘傳外科百病全書卷之二

豫章儒醫吳居中應圖父蛭著

乳癰  
乳癰部



乳癰

乳癰之症有孕日內次養子者口外吹酒婦人飲食厚味忿怒憂鬱以致胃火上蒸乳房化爲癰腫肝經氣滯乳頭發塞不通致令結核不散疔不可治

大凡乳土瘰癧硬腫作疔宜以葱餅熨之其法用個爛口糖以炭火入瓶內上以熱灰填滿瓶口用葱葉及葱白搥損令遍裏瓶口用手帕裹瓶倒執將瓶口向腫處任意輕上熨之切莫亂施針刀以傷其房縫或初起隔蒜灸灸猶可

祖傳內吹初起單方鹿角磨酒多服外吹初起單方用百齒霜麝香為丸雄黃衣服七九出汗就愈不出汗再服七九神効

龔傳秘方治乳瘰川漏芦川山甲金銀花白芷稍遲齋貝研末

京赤芍甘草節各等分白水煎數沸方人大黃煎一二沸取起頓服被蓋出汗次日膿血盡從大便出神効不愈再服數日

龔愈園製治乳瘰乳癰神方口外用銀搗散敷內即服防手連齋

姜蚕陳皮青皮貝母漏芦烏藥薄荷銀花羌活升草煎湯口如

不消再用土烏藥煎水洗三次果勢甚即服防手膏歸白芷陳皮青皮貝母姜製漏芦川山甲乳香沒藥人參黃芪肉桂

惟內吹者不可用桂恐挂動胎也如潰爛外用化毒丹搽後用  
 白珠砂散或生肌散澀之如有乳久不合口用黃連陳皮各等  
 分將每條拌麻油蘸藥末透入如針刺久不出膿則生肌散  
 核久內脹作痛外腫堅硬手不可近謂之乳癰未潰者宜服瓜蒌  
 湯將潰兩乳間出黑頭瘡頂下作黑眼者宜服內托升麻湯已  
 潰者宜服方括散內上宜散及髮痘內補中益氣湯之類  
 ○瓜蒌湯 瓜蒌二錢 當歸 甘草 乳香 沒藥 各一錢 煎服  
 ○內托升麻湯 升麻 葛根 連翹 黃芪 當歸 鼠粘子  
 肉桂 黃柏 耳草 水煎入酒調服  
 又有鬱怒傷肝脾結核如蟹螯者大不痛不痒五七年後外腫紫  
 黑肉漸潰爛名曰乳癰滴盡氣血方死急用痰核內十六味流  
 氣飲及單青皮湯兼服如虛者只服潰肝解鬱湯更加清心淨  
 養庶可苟延歲月以後必于乳下潰一穴出膿

○清肝解毒湯 當歸 川芎 白芍 熟黃 柴胡 白朮

人參 陳皮 炒梔 茯苓 牡丹皮 貝母 水煎服

婦人乳頭裂治宜秋後茄花陰乾清油調敷或秋後茄子裂開者

陰乾燒灰存性為末水調敷

乳旁癰腫見心者用豬兒腹下毛乾鍋內煨存性為末干搽或入

輕粉少許清油調搽

乳中癰腫起痛用川黃連大黃各二兩水煎服

乳痒先以粉草磨水揉後以油醬揉効

乳後乳如石硬不酸用陳皮一斤洗白鹽水大半下半斤生薑

共為丸青黛為衣煎將菱雪花煨米送下三四十九或酒吞服

乳中齒花石榴發此症治者少不治者多亦宜生肌之藥內吃外

敷而不生肌必死

方子乳毒治婦人微異蓋怒火為認過度以致肝虛血燥腎虛

精法不得上行痰瘀凝滯亦能結核大槩男子兩乳腫者用痰  
 核內十六味流氣飲左乳者足三陰虛鬱怒所致用痰癰內八  
 物湯加山枝牡丹皮或前清肝解鬱湯火盛風熱者更加炒桑  
 如飲食少進作嘔胸脇作痛眩昏煩痛潮澀者宜大頭腫內六君  
 子湯加芎歸柴胡山梔  
 如潰爛作痛者宜用痰癰內八物勿加黃芪肉桂腎虛再加熟地  
 如因勞怒則痛併發寒熱者宜用五疳內補中益氣湯加炒黑山  
 梔子不可輕用清熱敗毒之劑


臟腑癰疽圖



自前全書卷之二十一  
 五臟六腑圖  
 五臟六腑圖

口每穴內隱七痛七為疽肉上微起者為癰假如中府隱痛者肺  
 癰也各穴依此宜流氣飲或托裏散加當歸山枝黃芩杏仁

疽 片



癰 陽 兩



肺痿肺癰

是症經年久咳熱甚葉焦而為痿倒草木亢甚則枝葉痿落也火  
 燥甚則腐脹為膿血成癰病因汗吐下後亡津或腎虛火炎或厚  
 味燠蒸而成其候惡風咳嗽鼻塞流涕項強不能轉側皮膚不潤  
 淨胸脇服滿呼吸不利吐痰血腥穢若嬰辨真假將黃豆根研水  
 服上得者真服不得者不是肺癰也

肺痿肺散而寔咳多寒熱自汗宜知母茯苓湯去門冬

○知母 茯苓 湯 知母 茯苓 黃芩 五味 半夏 柴胡

白朮 人參 桔梗 薤白 川芎 阿膠 甘草 欬散

如咯血將交癰者紫蛇散全銀花

○紫蛇散 紫蛇 知母 貝母 人參 茯苓 桔梗 五味

阿膠 甘草 生薑煎服 火盛者人參平肺散等九含化

○人參平肺散 桑皮 倍下人參 知母 地骨皮 五味子

青皮 枳殼 茯苓 黃芩 麥門冬 各等分 為末 子人

喘急面浮鼻塞胸脹及喘不眠者宜用此散三兩為末大匙三十

以水三升煮取一升再煮去其煎至七合頓服服盡三日一劑

或單以葶藶隔紙炒為末水煎服是 知母 茯苓 黃芩 五味 半夏 柴胡

但傳肺癰之症始則易治膿成難愈味微紫而數未成膿也肺緊

而數已成膿也男子以氣為主十救一二女子以血為主十全



六七八九初起口鼻咽喉乾胸脇隱痛咳唾膿血氣息脫鼻治宜

桔梗枳三升草酸一門冬一兩煎服或加味敗毒散調之

加味敗毒散 薄荷 瓜蒌 白芷 烏梅 生黃 黃芩

歸尾 半下 桑白皮 茅根 何心

如有膿腥氣上衝喉而嗽及吐膿者俱宜消膿飲或用生地黃熬

一匙黃天門冬生薑密水飪上蒸熟細上頻服若收口以槿木皮

白欬煎服

消膿飲 貝母 知母 生薑 阿膠 桑皮 防丰 天門

冬 桔梗 薄荷 蘇子 白欬 南星 半下 川芎

射干 杏仁 甘草 白芷 烏梅 姜煎服

如咽痛者用桔梗湯便秘者前太乙膏為丸白湯下

又有胸脇開一竅口中所咳膿血與痰相應而出者宜大補氣

血上多者楊豆湯冷熱不調者前雲母膏為丸并桔湯下

一梅豆湯

黑豆

烏梅

煮以仁水煎服

以阿膠

補腎水不足虛火上炎咳嗽吐膿血喘而短氣發熱作渴小便不調

治宜參芪補肺湯加皮脂少食加升麻桔梗去山茱助山藥熱

參芪補肺湯

人參

黃芪

白朮

茯苓

陳皮

當歸

山藥 麵粉 甘草 熟地黃 錢五 牡丹皮 麥冬 煎藥面赤當補脾腎面白當補肺益補脾以生肺金補肝以生腎也如陰火發熱面赤咳嗽吐膿血痰如糯米粥脉浮大者火剋金也不治如脉浮痘瀉可治以其有本脉也

心癰

心癰之症生而乳中開狀如豆大三四日起不早治入于腹十日

死又云外發可治內發傷膜難治

如病此症小便澀者宜用黃連耳草桔梗白芷天花粉瞿麥淮不通或清心散如大便秘者用前方括散內固清心散或黃芩黃

連耳草 桔梗 白芷 生地 天花粉 大黃

○清心散 蓮心 赤苓 赤芍 生地 麥冬 知母 甘草

生姜 蜜子 同煎服

如生干胸乳上些有孔者亦名蜂巢癰發乃心火劫盛治宜急以疏導心火之藥稍遲則熱極難治

如心頭有孔常出氣水謂之心漏治宜鹿茸去麝附子龜去藍花共為末蒸肉二兩搗為丸空心酒下

予治一人病井疽已潰內虛耗裏清心之劑外用敷洗燻割生肌飲口如法治之一月全愈

### 脇癰

脇癰之症蓋由脇肝心火盛虛中有熱決不敢投陽藥倘誤投熱劑則虛熱愈盛易傷骨髓慎之

初起宜乳廕內瓜蒌湯或髮疽內柴胡清肝湯治之唯潰後方

一、敢清熱托裏兼滋腎本

胃癰

胃癰之症多因飲食七情火鬱滯被外感寒氣所隔使衝熱之氣填塞胃脘胃中清氣下陷故胃脘沉澀難氣所隔故人迎緊盛有此二脉者胃癰重也

外症寒熱如瘧胃濁則肺金失養故身皮錯綻或咳或嘔或噎而俱宜大射干湯主之

○大射干湯 射干 赤苓 赤芍 白朮 枝子 升麻 用

水煎入蜜生地黃汁開服

如痰壅者甘結湯如大便不利者前太乙膏為丸服

如小便不利者及腹滿不食宜三仁湯

○三仁湯 冬瓜仁 薏以仁 桃仁 牡丹皮 白水煎服

如藏出食少者宜補中益氣湯升提胃氣或佐以前藥調之不可

專治其瘡

腸癰

腸癰之症濕熱鬱積成癰小腹疼痛小便澀  
 腹脹大轉側聞有水聲或遠勝生瘡出膿大  
 此症脉遲緊若未有膿也用大黃湯下之或用  
 香木香連薤白大黃通草獨活扁竹甘草下之  
 ○大黃湯 大黃 枳實 芍藥 甘草  
 若脉沈滿者 宜用當歸 川芎 白芍  
 仁 紅花 木香  
 如脉洪數者已有膿也宜前胃癰內三仁湯  
 如脉數外無潮熱內無積聚身皮甲錯腹急  
 虛陰冷凝痰成癰宜牡蠣或十宣散之類  
 ○牡蠣散 人參 黃芪 天麻 白朮  
 白芷 川芎 木香

疔瘡歸

薏以仁

桃仁絡

一官桂

耳草絡

紅水煎服

如小腹疼痛小便不利此膿毒也亦宜牡丹散治之

如令熱相併或痛甚或大便秘小便不通者俱宜前雲母膏為丸生

膠煎酒下利去瘀膿則愈

如下膿過多者宜肺癰內梅豆湯加甘草桔梗和之蠟丸九妙

如虛兒傳治腸癰小腹一更難者用當歸和瓜子合蛇退

條水煎服四五貼口如腸中痛不可忍者用敗醬湯瓜子赤芍

桃仁芒硝大黃水煎服六七貼口如腸癰成膿者用牛黃和血

蟬蛻大黃牙硝牽牛子方子故芷其為末溫酒調服以利為度

若膿止後用參朮內補中益氣湯或五寶內八物湯以固本元

愈後却宜靜養稍動作累果及破驚恐必腸斷而死又云癰生

小腸分尤可治癰生大腸分近肛門者難治肛門破者即死

腹癰

腹癰之症生于肚腹皮裏膜外左關脉洪按而腹痛甚者真也乃  
背深七指火餅以致皮虛氣滯而成小兒多因驚積蟲積而成食  
積疳氣相類不可誤治

此症慢腫至硬肉色不變未自膿也宜 人參 白朮 茯苓

川芎 白芷 當歸 枳殼 甘草 或前方括散內托裏散

如癰腫痛甚者邪氣凝也先用腦疽內活命飲隔蒜炙以緩其毒  
後用托裏散以補其氣

如腫起而軟色不赤者膿成也宜方括散內托裏散毒散若膿成  
而不外潰者氣血虛也則針刺之

又云此症不問初起已潰未潰俱宜吐胃元氣而佐以行經活血  
若誤用剋伐及利下涼藥則腫不能潰已不能斂決難治之若  
曾經誤下及服降火破氣消痰之藥大劑參芪姜附或疔瘰均  
八物湯加桂枝急救之

臍癰

一人臍腫紅痛久服流氣飲針開口膿出四五箇月不止後用蒜  
 盛艾炙內服五香連壽湯全愈

○五香連壽湯 丁香 楠木香 沉香 乳香 沒藥 貝母

連壽 人參 各一兩 羌活 一分 附子 半分

如臍上生瘡出水不干用枯凡白龍骨末為末麝上如神

小兒臍癰以紅綿燒灰黃牛蓋燒灰干細粉等分溫則搗于

則香油調搽

小兒臍水不干用鳳凰衣燒灰存性搗之

北角癰用腦疳內千金托裏散神効

背

腰

部

臍肚癰





此名脾肚發生在肩下脊上脾肚之間乃因飲食風毒或腐一片  
 深一寸能潰在背不穿膜不死急治脾胃中之毒內服方括肉歌  
 護心散外用敷藥慈壽芥心大要服藥哉佳如通脊皆腫者不治

石脾蓮蓬發




此名石脾蓮蓬發外如蓮蓬內有子孔失治恐生毒奔入心太  
 要用方括肉托毒散加黃芩油柏等蓋散取之不令攻心漸消可  
 治通背腫亦危

左脾癰又曰左時癰




此名左脾癰生于左臍之間初起灯心點破內服後疔瘡內通  
疔湯汗之即愈

脊中蜂窠癰




○此各脊中蜂窠發生在正當脊心形如蜂窠但有孔在上者通  
是反病不耳治亦以前方括內托裏散加菊花生肌定痛妨毒  
攻心八膜難療

右搭肩串痧




○此各右搭肩發生在右搭肩骨上以動之處可治若串左肩難  
治宜服前方括內托裏散加升麻桔梗外用玉紅散或綿絮燒  
灰雞黃皮焙干爲末摻之干老麻油調搽

左搭肩發



○此各左搭肩發生在左搭肩骨上以動之處可治若串右肩治此難矣


對心發



○此各對心發生在对心處是症極重乃因心火盛而熱氣會生

于此其毒先盛走暴急用疎導心火之藥解之然後用生肌藥

龜背癰



此白龜背癰生于背上頭尾俱尖四邊散大如龜之形乃因飲食不致而氣食相閉合陰虛而成之氣虛而散者所以開口而潤之以托裏補藥治之

走流注癰



○此名發走  
定熱治之  
味流氣飲

發背

此注發又各瓜藤發乃毒氣乘風熱而走急宜疎風  
氣自息昔流注于手腳腿者必死無疑治宜寸豎  
多服潰膿針破車厘化毒丹夕攪

蓋背山勝腫  
勞以致水結  
祖傳云真指

背脈所主然五臟所係於背或醇酒厚味或鬱怒房  
多痰凝氣滯或被外邪與毒相搏隨處發生  
如腫處多小口如沙眼樣若無者乃陽毒也又云背

發黑即死

者死不可心但乎冷不痛不紅黑陷者救急以生

姜貽毒上

又灸凌紅方可外治又云背發之症光痒後痛最爲

惡症始起

如豆者便是宜灸之初灸不痛灸之極痛則止初灸

痛灸之不

痛則止使毒氣隨火而散或稍大不可灸者用針刺

破火筒及

以之五次去惡血又有甚腫而大已成不可破者急

以斷法斷

用白霜梅皂角二味燒灰存性爲末不發熱者米

海葵汁調至回圍則外即不左開如發熱者用茶調至後以鳥

不伏根水洗淨醋收執氣薰二三次汚肉去盡方用黃柏草烏

川山甲炒切末鴨子清調敷或用白芨白欬荆芥赤芍黃柏大

黃當歸白芷南星赤豆草烏寒水石煨商陸等分爲末地黃

汁調塗番口後用片腦龍骨乳香沒藥兒茶血竭輕粉爲末攪

或炒雄黃硃砂白凡硃砂爲末攪之內服前方括內十宣散處

強指揮傳治初起背發陽毒除疔方用官桂法彼連喬去純乳香

沒藥歸經黑牽牛鉅大黃鋤姜山脂白芷粉草節紅當

歸經承川山甲炒其爲末每酒調三錢服

原圖製追毒瘰癧散治骨發已成未成服之無不應効

先服大參當歸黃芪白芨川芎防手官桂桔梗白芷瓜蒌仁金

銀花甘草各等分大台一貼用生頭酒煎熱服出汗爲度後服

白芷紅川山甲炒麻杜石乳香沒藥煨白姜重炒去皮


甘草粉大黃細皂角刺已上八味要洗製煉依法相  
研為極細末用當歸酒四升剉碎將半酒半水三匙同煎至前集  
末空心通口盡服如當歸酒不足加好酒調服以利膿血三五  
次為度利後用藥補即止服藥後忌用油膩生冷煎炒熱毒及  
諸凡發物且慎弗行動勞碌視為常疾須靜坐六七日此方百  
發百中無不應驗

如盧兒傳治背發已潰未潰得效良方

外用厚朴仁煨姜陳皮仁 甘草節仁 椿木 豉 桑葉 黃蘗  
紐共為細末清油調塗 內服乳香 沒藥 赤芍 絡二貝母  
川山甲 炒皂莢 當歸 絡二 防丰 紐白芷 紅血退 紅大黃 紐  
天花粉 金銀花 并甘草節 水煎生酒開服如已潰者用  
黃連煮酒 竹筒吸毒上其膿出後用黃連散水洗七後屏化毒  
生肌歛口如法




腎俞發



○此名腎俞發乃濕熱色勞所致宜用藥解附腎之玉堽更用生肌夾攻之治法詳後

下腎俞雙發



○此名腎下双俞發亦由濕熱房勞鬱怒過度故而腎俞俱生也  
治詳後

腎俞發

腎俞發症原因受濕并怒氣飲熱酒傷工腎內流毒在腎俞生疽  
若下腎俞發更兼房勞鬱怒過度所致也又有腎俞一發脾腎  
上一發肩腹上又生一發亦名雙發但此三症陽發于外者勿治  
陰發痰發傷腎腹及膿稀者死

此症核起痼腫發熱疼痛色赤作渴脉數有力先宜服腦疽內  
活命飲後用方括內托裏消毒散

如腹腫不熱微痛色黯作渴脉數無力及自虛也宜方括內托裏散  
如發熱陰虛者宜四物湯加入參白朮

惡寒熱四逆甚大者陽氣虛也宜單八參湯或八物湯加芪桂  
如初起食少者邪盛脾虧急用補中益氣湯救之

祖傳治腎命總方


內服用方括內托毒散如車前木通淡竹葉

牽牛何首烏脚連復用內消散及生肌定痛散敷之及膏藥貼  
更以痰核內十六味流氣飲加減服

大炆燐腫氣血勝毒者易治慢腫服托毒散不應者乃毒勝氣血死  
在旬口或已發出而不腐潰者急用托毒裏散兼補脾胃不腐者  
死在二旬若已潰而色不紅活者用托毒裏散加人參黃芪肉桂  
及補脾之藥如不能生肌瘡口黯暈十八面不斂乃脾崩也脫

○腎腿部

腎癰



# 便毒



## 腎癰

腎癰之症乃陰虛血熱所致當知腎居小腹之後部位僻奧雖曰多血既氣既罕到血亦罕來尤忌此誠不可慮

此症初起未成膿者隔蒜炙之再用葱熨法

如欲作膿者內托羌活湯如痛甚者前方括肉活命飲

○內托羌活湯 酒黃柏 黃芪 防己 當歸 稿本 連翹

甘草 蒼朮 陳皮 肉桂 牛膝半酒煎

如腫便痛者宜方括內托裏消毒散或托裏散

如脾虛不能消散或食小不作膿者或右臂腿者宜大頭風內

六君子湯加荳蔻黃芪

如脾虛誤服消導藥以致氣陷下腫痛甚者宜補中益氣湯或八  
物湯加荳蔻潰後亦宜進此二藥以固其裏兼節酒色戒燥暴  
乃可萬全如內傷房室兩臂腫硬二伍不通者宜八物加荳蔻  
車全牛夕故芷小茴之類

曾一人近肛門處作一毒如碗大各曰腫毒已作成膿用艾依法  
炙一二十壯次日將麵粉作一團箍其上又將槐樹皮爲一圓  
片蓋麵粉圈上將大艾爲一團槐皮中取出黃水爲度其槐皮  
要將粗皮在下嫩皮在上如此治之即愈

臂疽瘰 即臂疽

方用硫黃末鋪帛上捲筒爲條將麻油浸透倒提點灼滴出藥  
油俟冷頻搽

一方用核桃肉七箇人楓子肉一个硫黃別水銀分共爲調餅

便癰

便癰俗云便毒實血病也生于腿膝小腹之間近陰土廼厥陰肝經及衝任督三脉隨道精氣出入之路也或入房忍精或思色不遂或泄不泄敗精凝滯爲於腫痛在膝腹之間

江氏傳先用蘇葉 陳皮 香附 麻黃 平葛 升麻 赤芍

羌活 一貼煎服 後以川山甲 牡白姜 皂角 五靈脂

黃共爲細末酒調下通三次而安或去五脂加白芷貝母

亦妙 体虛者用 人參 煑熱再入大黃紅同煑熟取服

初起及久欬成漏者俱宜蠟凡九神効

應員制 治便毒用 姜虫 檳榔 牽牛 貝母 白芷蒲

大黃 川山甲 猪乳 同煎炮皮硝紅生磨大黃四子空心服通四

五次以弭止之外用倍子白凡醋調敷如要腫破用烏豆去皮

生搗爛鴨清調敷過一夜即破出膿

瘡氣 是症凡便毒下些近陰下廂治宜大黃五川山甲壯黃柏

黃芩 姜朮 白芷 絡三 白水煎生酒服被益出汗為度或

黑牽牛七豕大黃五豕牛蒡子 貝母各三豕羌活 獨活各

豕甘草一豕好酒攪空心熱服四貼

駟馬 是症即便毒左右兩邊俱發或先有疔瘡而發或卒然起

核疼 痛而發治法同便毒但潰後亦如總要敷洗化毒生肌

路岐 俗名痕瘡些小瘡癰此疔小兒患之多因食積痰滯

相傳用牽牛雄黃川練子化粉枳壳貝母甘草等分為末南酒調

服三五劑出膿即消

如痛不可忍者用細辛黃連川山甲乳香沒藥連翹丹尾大黃枝

子銀花壯研車前子防手朝核桃去油酒煎五更服

如腫不消用生黃連黃柏輕粉為末搽之塩湯洗之內以赤

生薑

羅燭燐熱酒服之汁出為度滓用敷瘡

通淋

治宜山姑貝母川山甲大黃芒硝棋榔我米煎服或大黃

川山

甲美虫黃芪牡研酒水各半同煎空心服

題

懸羅之

症乃足三陰虧損生谷道則陰囊之間初發其痒狀如松

子或如

連子曰久如桃李如以赤腫若破則大小便從此中而出

不可救

也輕則滴盡血而死重則內潰而亡

此症初

起濕熱滯作痛焮腫者治宜腦疽內活命飲去大黃如

蒼木料

如不成膿不潰者八物湯或腫脹已成者急針之勝其性

如血虛

首宜歸芎芩黃人參白朮氣虛者參朮冬苓歸耳草

如脾虛

者補中益氣湯如久成漏者八物湯加芪桂或蠟凡九此

病當

服國老膏雖患亦輕雖清亦淺若誤用涼寒必不可救

國老

骨粉草帶節用山潤水一碗浸三時令透以慢火炙



干仍投水浸透再炙至水干為度酒三盞煎至八分并渣空心服三日一服

谷道中生瘡 治宜水中何葉卷筒綿裹納下部日三次即愈

肛門爛出水作痛或痒或出血用石硫黃五錢冰片一錢為末搽

但先每用銀花新艾花椒槐花水洗

肛門腫痛熱毒用枳殼荊槐角黃連各二兩陳冬瓜皮二兩右為

末空心酒調服

瘡瘡

痔瘡不論男婦小兒俱有何也經曰富因酒色財氣病緣負重擔

輕婦人因經後受冷月後傷風小兒多母腹受熱利後積血結之

臟腑虛而血脉未貫風濕犯而食毒胃因七情鬱結聚怒交戰於

是血氣下墜蘊聚肛門宿滯不散而衝突為此症也然症分二十

四原有歌詠云痔漏分二八憑君行細看穿腸并鼠尾酒色兩相

糊丸如梧子大每五十空心服酒下服二三次爲止

如小便不通用葱一握煎湯洗小腹則通

如大小便不通用澤瀉朱苓赤苓白朮益腎仁

皮枳壳車全木通給一小荷五分甘草燈心煎空

如血不止用烏梅艾葉五井花水煎服或五倍兩生清丸

芟茶二兩煎水洗肚其血自止

如痛甚者用前服冰片乳香沒藥爲末水調搽

如疔不收者用蠟皮一個確內燒焦黃存性磁石礱碎肉桂三

錢布煨三爲末米飲調服炙熱鞋底托上

如大腸結硬下墜多血痛不能忍用歸尾澤瀉生地黃只壳大

郁李仁蒼朮秦艽皂角仁研成膏麻子仁一錢半水煎空心服

祖傳細方不問男婦遠年近日二十四種痔漏不用刀針神效

○枯痔藥白砒爲末白凡經搽二味八錢杓內先用白凡末

又放砒正帳又放紅白凡蓋面將慢火熬至烟淨出火毒入後

藥兒茶和血竭蛇含石步脂硫花分硫砂雄黃礞砂

絡一乳香沒藥各五份細而輕粉硫黃其石藥研右十二味

其同一處為極細末合五分之一用液津調開捏作薄弄餅子

如此大藥餅又放些簪脚大用陰干聽用大凡既痔之法首用

喚痔散當先喚出痔來纔好下手上枯痔藥

○喚痔散車用生胡椒為極細末空心用生酒一瓶隨量大小

送下待半上午其痔即番出來方用津液調前枯痔藥如稀

糊樣週圍搽上枯藥若道中納一藥餅痔孔內插上簪脚樣

約槌子一枚後用白帛封固但上藥之後疼痛難禁則不必

憂心書云若藥不晒眩厥疾不瘳故曰惡病还用惡臣也但

是上藥之後血即隨手而止痰則刻日而安每三洗三換新

藥若是大便堅硬須用大黃酒蒸透熟為極細末每日用

調肢一錢以稀糞為度間服蝟皮散

○蝟皮散 治二十四種痔瘡出血裏急疼痛

槐花 艾葉 炒枳殼 地榆 當歸 川芎 黃芪 白芍

白凡書買象 蝟皮 桑寄生 三仙角 煅黃柏 猪後

蹄重甲 炙甘草 右為末煉蜜為丸如梧子大每服五十九

煎米湯下換藥敷至六七日看痔瘡變黑色堅莫乾枯不痛

方用浸洗之藥拔去病根若是痔瘡未乾枯過腳還要止

藥凡初以乾枯堅硬為度

○浸洗脫落痔根方 用生艾葉 白頭翁 素渥草 冬青葉

左癰藤 綿花子及各樣疎風散血之藥煎出水來將痔瘡

燻洗待藥水溫七之時坐在脚盆之內日日洗浸五七次待

其痔瘡浸洗至五七日之內其痔根自然脫下以落盡為度

總不用浸洗待落下痔根隨用生肌散搽在痔瘡之內每日



別加稿白外如黑  
四無王丹或方括內  
無淫虫惡具宜收  
殺虫溫商用前  
煎

○加味槐角九 槐角 生地 熟二葛膠 川芎 路五 當歸 黃

芩 黃芪 黃連 秦艽 防丰 只元 地榆 升麻

連喬略一白芷極其為末蜜丸或酒糊丸梧子大每五十漸

至七八十溫酒送下

又有初起因風冷者久則壅而按濕熱者丹溪用參朮黃芪芎歸

為君佐以蠟皮蛇退牛角腮蜂房之類服之外用津唾調肘子

未依餅如錢厚按瘡上漏大艾漏小艾灸令微熟不

可令痛乾則易新餅再灸如倦暫止次日又灸宜至肉平為度

外用雲母膏貼之畏火者內生肌丸最妙凡癰疽之味與分

祖傳治漏症 用人言 明凡而乳香 沒藥 朱砂 各五

含石 兩七次先將人言為末入炒鍋內火煨待烟起將明凡

白全書卷之三 附錄前項 二一

益人言上脊有烟起處以凡未填之藥以用凡未蓋為度候凡  
乾白色待冷去上面凡未取人言為未八前蓋其為細末將一  
半麵糊作針一半綿皮作條蘸麵糊拖藥去其乾用真綿纏凡  
遇漏先將藥針入漏內漏深八深漏淺八淺待三日毒盡却用  
帛條八漏處漏深八深漏淺八淺日漸抽出其帛條即生肉  
凡遇穿腸痔漏用好細絲線八蜈蚣含石醋內煮過要從裏揪月  
內收取蜘蛛編過網絲一相共合絲線穿入漏孔內穿法先將  
野灯心草破開些穿入透出却將藥線入于野灯心破開處透  
出如無野灯心草將嫩布線而掛繫銀絲上穿入却將長線入  
糞門內接出去銀線却將絲線八一根于布線內抽過絲線再  
將原絲線頭八第二根布線內抽過絲線來却不穿來去兩轉  
收緊締一匝待明日解開盡又收緊些仍縛一匝莫令寬日日  
如此線落後以生肌台口

○煮線法

芫花根大戟根金項玉梅花五爪龍鵲巢共八水內

煮汁去滓將後微線線入汁內煮一二沸取線風乾聽用

如痔漏不脫綿者用百草霜草烏尖絡一為末并花水調筆點

如脫線不生肉用枯凡五倍子為末搽之即生

如穿線不收口用參附皮為極細末生肌甚速以涼藥煮過芦甘草石

次之如痔漏痛不可忍用黃連黃柏蘇合蘇合砂水片乳香沒藥白

其等分為末水調作錠子陰干插入孔中

如痔漏血不止用陳棕箬葉枳實歸身炒灰歸尾炒散甲炙蜂房猪

主懸蹄螻蛄黃柏槐角共為末米糊為丸梧子大每米湯下三

如原有痔漏肛門別生三塊作膿就在痔孔出者乃食積注下也

宜連魏散

○連魏散 黃連 阿魏 山查 神曲 桃仁 槐角 連翹

皂角等分為末以少許置掌上時上拭之津吞下



子尊治一人肛門外陡生一毒其勢如核久而破出膿其臭遂將  
猪肉湯鴨毛刷洗以貝母末搗即安後復底一孔出水予以爲  
漏用白雷丸一兩皮硝四兩將公猪大腸一頭線扎將皮硝築入  
一層雷丸築入一層如此築凡層而頭蘇扎將五錢腸火焙乾  
用如吃下取出雷丸同石乳香五錢沒藥五錢苦楝粉四兩刺蝟皮  
一焙切共爲細末酒調服

龔憲圓製透漏丹 治漏如神

象牙末 五錢 黃蜂窠

姜蚕絲 去 重退思 顧廣木香 出乳香

沒藥 血竭 絡三

右八

味爲末次用黃蠟八兩銅銚化熬白色

離火入煎藥末攪勻

成汁傾入水中取起爲丸此一料藥分作

百丸臨睡時服一九

早晨空心一九俱白湯下又服後方枯凡

再鹿角末 兩 芝麻

一 蜜丸如倍子大溫酒下三十塞按去鹿

角加米牙而黃蠟

爲丸常服漸根

如虛兒傳加味蠟丸 善治腸癰痔漏瘰癧等症日夜疼痛

水不乾用黃蠟一斤 白凡一兩 硫磺三兩 雄黃 陀僧粉 一各

為末先將黃蠟入銅鑊內 鎔化再入蜂蜜五兩同鎔隨入四味

末末棗攪勻待冷為丸如梧 定大每服二十或酒或白湯送下

在上飯後服病在下空心服

張鼎

養雞腎瘋之症屬肝腎經都 統而腫掀熱如小兒因啼叫怒氣積

聚或虫咬風吹治者每宜詳 因而施治之

腎囊初紅腫小便澀滯者用 正散主之

○八正散 車前 瞿麥 扁荷 滑石 山枝仁 犬黃 木

通 甘草

外法囊腫脹二便不利者用 白芷 白朮 桑白皮 炒木通 猪

苓 為末每姜湯下五錢小兒服

如全因入房囊腫大如斗許小腹服悶便澀發熱日乾痰壅命在

一友幸宜腎氣丸料加車前二牛膝煎香滋腎丸後仍腫痛者宜

補陰托裏再候膿而針之

若膿厥而便閉者熱毒壅滯也以方括肉托裏治毒散或又不念

者熱毒未解也宜清肝益榮湯膿已成者用腦疽內活命飲

○清肝益榮湯 當歸 川芎 白芍 柴胡 炒枝 炒車前

茯苓 木瓜 胆草 熟地

如膿潰皮脫幸九懸掛或內見筋一條不消陰囊悉腐玉莖下流

貼膿者亦腐如半邊筆管只宜方括內托裏散加故芷黃芩三

味元氣城兼服補中益氣湯倍參芪歸木大補氣血脾胃外塗

白蠟骨蒸莖旬日可愈雖曾裏九府爛亦無妨以白脂膏貼

如腎囊下有五六孔出膿宜以當歸 川芎 白芍 熟地 生

地 白苓 巴戟 川續 肉桂 大附子 鹽煨 慢燒 歸 胞 魂

細益智仁 防風 金銀花 皂角莢或加升麻土茯苓并貼

用猪胰子油四兩或肉同炊空心酒下如孔爛出膿用欠寔肉

配青鹽狂牛黃分射香麝膠蒸肉爲丸服外口化毒丹 七日

狀後以生風散攪之

陰囊玉莖癢爛甚者用防羊肉 白蒺藜白附子各一爲末以猪

腰一个用刀破開將末藥酒濕帛包浸濕裹以有殺火煨熟空

心服下不効再服屢試有驗 陰囊氣瘡用蒼朮紫蘇煎水洗

囊癢抓破流水用黃連細茶鳳凰衣爲末木油調搽或蒼朮茯苓

皮葉荊厚朴杜松三貼煎湯擲洗

腎囊生瘡作癢或癢後流水作痛治宜用川椒蛇床細茶槐柳條

茄根煎水燻洗七後用杜松搽之

陰囊兩傍生瘡濕甚者用杜松黃丹醋二粘凡二兩爲末搽一

紫福楓即陽物紅紫癢不可當者用山枇杷葉莫及观音茶葉二

味注酒吃其澤用火土略

烘熱敷藥上冷了又烘熱敷上

子屋南京見一人陽物上生

白芽一二根如菜豆芽脚樣其痛如

針刺難忍用艾置芽下貼

四處一灸即倒痛上全愈如神

小兒外腎腫大陽物透明用

左顧牡蠣三錢乾地龍一錢

末津液調敷外腎即消朕

者劉子清調敷痛處

小兒內怒氣積聚陰腫用桃

仁一錢牽牛一錢炒熟去官桂 牡丹

皮 大黃粉三錢末蜜丸

如菜豆大每用青木香葱白鹽少許

煎水送下五七丸 小兒

熱腫痛用蚯蚓糞并草汁調至

小兒外腎腫赤腫痛不日退

皮如赤亮愈而復作用老松皮燒灰

臍粉香油調搽

小兒坐地為風吹或重吹而

腫外用蟬退鐵煎水洗再溫再洗內

用米苓澤瀉茯苓白朮甘草煎服

小兒陰伏生瘡用黃丹黃連

青黛等分以末泥敷肝油調搽

大人小兒陰伏痛不可忍單用金砂酒調服神効

小兒大人陰囊併玉莖紅腫大疼用 塩炒熱令病人坐定將藥

中匙炒鹽包兩囊玉莖即消

瘡

凡陰頭玉莖腫痛生瘡乃腎任衝三脉之屬腎脉屬陽任脉屬陰  
衝脉屬厥陰夫陽脉主氣陰脉主血皆由氣血大熱有毒有蟲  
故生此疾也玉莖紅腫痛爛流膿出汗日夜不乾甘草水頻洗  
後用羊角燒灰存性爲末每老酒調服三錢

玉莖挺長腫硬皮塌臃股難行而脇走氣逆以柴胡人參黃芩黃  
連黃柏煎服其腫漸收葦中有移未消以青皮爲君少佐風藥  
未服之外以絲瓜子五倍子末敷之

陰頭出膿莖下痛之痛用柴胡赤苓升麻米苓澤瀉木通車前遠  
志山枝瞿麥牛夕生薑灯心酒煎空心服

玉莖腫痛出膿日進行步夜附掣痛先服蠶蠟內八正散如故後服導水丸加挑仁苦硝三五次腫消痛減即安

玉莖腫爛流水先將芭蕉葉艾葉白凡川椒煎水先燻後洗再用

海礬屑二錢輕粉二分枯凡一分水片一厘共為末搗

如因熱毒陰頭結毒或龍衣磨破用蠟上節霜刮下一點即愈

或白螺螄一箇灌搗粉入內火逼再入片三厘為末攪之如神

如由腎虛風濕相搏邪氣成之疼痛成瘡浸淫汁出狀如疥癬名

濕陰瘡宜黃柏磁條刮下末同蛤粉等分搽之

如因久曠房室思色動慾以致敗精流入莖內初發如粟赤腫貴

一爛作白瘡痒妨悶名妬精瘡先宜用地骨皮蛇床子煎水燻洗

洗後用黃連欬冬花等分為末津調敷

如因婦人子宮有敗精帶濁或月水未淨與之交合後又未洗男

子腎虛邪穢滯氣遂令陰莖連繫九腫痛小便如淋名陰蝕瘡

治宜外用鳳凰衣煨黃連等分輕粉片脂紗為末乾摻或鴨子

清調敷內用婦尾赤芍生地防丰黃連黃柏知母澤傷小茴耳

草煎服如陰毛問生虫作痒者搗硃仁泥塗之

莖中痒出白津多因脾土軟弱不能收主金水以致肝經血虛火

燥宜用紫痘內補中益氣湯與清心蓮子飲間服

清心蓮子飲 蒲芩 蓮前 茯苓 麥門冬 地骨皮 黃芪

玉莖痛不可忍用石乳 香一錢 葱汁調搽

下疳毒因所欲不遂 交接不潔以致邪毒浸潰成瘡毒七日

久不愈或成便毒或疳爛陽物多致危篤故俗云疳瘡難癒

周居白先生傳一方用細茶濃煎入糖少許洗上後用大茶葉煎

如虛兄傳用杏仁短酢粉分水片并其所爛口涎作餅貼或用

麻梗燒水洗上後用年久白螺蛳一繩冰片并為末搽

應圓製治再發神方內用防風 荆芥 連喬 獨活 黃連



黃芩 一知母 黃柏 蒼朮 赤芍 木通 胆草 柴胡

甘草 灯心 蕪空 心服 十貼 外用 文蛤 二分 牛黃 水片 煮

珍珠 仁桂 粉分 散相 用 二 分 共研 為細末 干搥之

如男婦 疥癬 旋用 五倍子 性 二 分 輕粉 三分 水片 為末 搥之

若女人 先用 五倍子 將小 確煨 至糜爛 置桶內 令婦人 以陰

門端 坐于 確上 上燻 至水 冷為度 又將此 藥水 傾出 煨熟 為末

煎 如疔瘡 腫不退 用益 先散 加防風 荆芥 何首烏 煎水 熏洗

祖傳 治瘡 極甚 者內 以真 荆子 晒乳 香為末 菜豆 粉為丸 每白

水送下 紅 一 日二 服外 以地 草兩 防丰 兩皮 硝一 用公 猪肉

湯洗 一日 二次 後以 白螺 壳 紅公 雞內金 三箇 瑞乳 香沒藥

象牙 末 絡一 珍珠 龍骨 路一 雄黃 一黃連 絡一 共為 細末 煮

燒燭 硃一 是症 腫爛 如螺 爛瀉 形初 起若 腫爛 不消 宜用 地茄 根

收水 燻洗 或用 松葉 樟葉 烏藥 葉楓 葉桐 葉俱 取表 煎水 燻洗

疥癬 方類

外用追子片燒灰片腦片各其為末攪或磨綿布燒灰攤患處  
內服黃連解毒湯

應言藥治蠟痔發爛去一邊極甚者內以姜重口一錢煎碎蟬退

仁十牙皂十金銀花碎杏仁細末土茯苓仁牙皂子仁汁精指

肉一俱分作四貼煎服肉炙皂子仁皆要吃下用外用上好

老墨磨水久浸漸消鹽茶洗用乳香沒藥俱煨 兒茶 血

竭 輕粉 海標硝 白芷粉一水片一海巴子一為末攪如

水不乾者用海標硝指甲扶落成粉米泔浸一宿火焙乾每二

分八輕粉一分為極細末搥之

又方不開年深日久出汁流膿日夜疼痛不止或病去一邊或病

去一截服之神効但用煙油一條去八熱酒內自跌成水服之

一日一次不過三服即乾水止痛任膿矣甚妙

婦陰瘡

婦人陰中生疾多因七情鬱火傷損肝經濕熱下注也

如陰次挺出一條尺許如蛇痛墜出水崩漏者刺髮疽內補中益

氣湯晚服龍胆瀉肝湯外塗養膏

如陰中突出如菌如雞冠四圍腫痛者乃憂鬱脾虛下陷先以補

中益氣湯加山枝芪苓車前青皮以清肝火兼升脾氣漸愈更

以瘦瘤內歸皮湯加山梔茯苓川芎調理外亦塗聚盧膏

陰中生細虫瘰不可忍食人臟腑即死令人發熱七與勞症相似

先以蛇床子煎湯洗後用梓樹皮焙乾為末人枯凡四分之一

射香少許敷之

又方治陰痒搗爛補苴納人或雞用煮熱盛熱人陰中或用大黃

微炒黃芩黃芪多醋赤芍玄參丹參小茺萸蛇床子各五分為

末空心溫酒調二服

陰內或癢或痛用女蛤皮硝煎水燂內服藥癰內八正散次用

陰門濕痒川芎芍藥地黃荆芥蒺藜煎服

陰門濕痒先用茄花根髮枯草煎水燂洗次日用雞子一隻炙中熱挾在陰門上過一夜取出虫物復用茄花煎水洗効

陰部濕淹瘡用文蛤粉白凡銅青絡一輕粉行乳香紐爲末搽陰內腫痛二便時皆痛大便有血以芙蓉葉煨置桶內坐燂內

服朱芩澤瀉白朮茯苓黃連黃柏黃芩芍手金銀花木通之類陰內腫痛小便欲去不去或痒用兼用芎芩湯加木通車前牛次

枝子七八貼煎服

陰腫如石硬痛不可忍二便不利欲死者用枳實陳皮略四炒金香熱以絹袋盛之遍身從上至下及陰腫處緩止熨之冷則又換直至喉中竟積是氣則痛止腫消便利矣

如時常陰痛者用四物湯加稿本防牛

蚌殼風用防風歸尾全蝎蒺藜倍下虫退姜虫芩尤黃連甘草服

五六貼每二貼煎洗

茄病內用酸車前白馬骨茄根茄花絲一猪精肉晒全收服

外用地茄根本通瞿麥確收置桶中插一孔半燠待溫洗

婦人陰痔用草烏杜斷九確盛入米醋煎熟將搭帶杜斷

婦人陰冷用吳萸入牛胆內令滿陰乾每取二十粒煎中即熟

如陰燥臭甚用柴胡尾澤瀉本通胆草生地車前水煎服每食

厚之陰內生瘡或出蛆虫用黃芩川芎當歸黃連大黃川椒細辛

煎水燠洗婦人交接出血乃房室有傷肝肝虛不藏血宜灸疽內

補中益氣煎服外用艾葉裏有人陰中或用乱髮青皮燒灰敷

之若出血過多見雜症者調補肝脾自愈

附骨疽 冬病腿間

附骨疽症內痛如錐外肉不紅腫矣多因冷露所侵或濕熱痰火

所致也如此症初起古方用青皮甘草煎服或隔蒜加火烘

发丸灸患處仍以葱熨法熨之若膿已成即用火針使毒不得  
內潰常生用亦無妨且不痛又易斂口

祖傳用 奪命散 人參 檀木香 沉香 雄黃 乳香 沒藥

落七 益母草 砂 枳殼 柳 三 木 撓 麵 糊 倣 餅 中 央 穿 眼 候

乾香 炬 灰 爲 衣 好 熱 酒 調 服 久 不 治 用 蜈 蚣 製 過 入 藥 內 同 前

服 攻 之 或 用 黃 蠟 出 根 韭 菜 生 姜 搗 爛 敷 患 處 或 將 艾 火 灸 服

剪 藥 雞 魚 潰 膿 深 針 出 膿 出 膿 如 不 愈 用 梔 子 紅 散 搗 入 出

緩 疽 迺 寒 氣 伏 于 骨 髓 其 腫 與 皮 肉 相 似 疼 痛 堅 硬 如 石 二 者 初

起 便 宜 溫 熱 托 裏 補 虛 次 乃 隨 證 調 治

如 外 感 因 露 卧 風 冷 寒 熱 襲 深 者 初 起 痛 不 能 轉 塞 熱 無 汗 經 久

寒 鬱 便 秘 者 漏 苦 飲 主 之

漏 苦 飲 子 黃 芩 白 朮 麻 黃 枳 實 升 麻 芍 藥 朴 消

各 分 大 黃 三 升 甘 草 三 升 煎 服

如不敢下者須分經內托汗散但在尻髻者用髻疽內類托羌活湯在腿內近膝股漫腫木硬者內托芪柴湯在腿外者內托酒煎湯在左腿外側漫腫長濶行步作痛以手按至骨大痛者宜腦疽內黃連消毒散通用鶴膝瘋類換蘇散

○內托芪柴湯

黃芪

柴胡

當歸

黃連

羌活

肉桂

生地 工爪菱

黃芪

柴胡

當歸

黃連

羌活

肉桂

○內托酒煎湯

黃芪

柴胡

當歸

黃連

肉桂

升麻

白芷

大力兒

黃柏

甘草

半水牛酒煎

肉桂

升麻

內傷厚味及勞役與酒後乘涼浴水邪入脾樞環跳穴左右積痰

疼血轉成宜青草蒼柏湯微汗服此下愈恐疽將成者急掘地

坑用火燒紅沃以小便令患者赤臥生其上以被席圍抱下截

使熱氣燻蒸膝理開氣血暢而愈

病傷生冷飲食寒涼藥物丘疑于內飲食如常宜腦疽類酒煎

氣血暢而愈

物丘疑于內飲食如常宜腦疽類酒煎

如食少淋瀝者用大頭鼠類六君子湯加當歸重香

如因勞役傷食右腿偏腫者用吳茱內一兩中益氣湯

內傷鬱怒腫痛如錐赤暈散漫光用腦疽類命飲次用痒癰類

八物湯加柴胡牡丹皮山枝

內傷勞瘵而腿腫痛寒熱食少此濕痰下注也亦宜吳茱類補中

益氣湯加半夏茯苓芍藥

兩腿膿血瘡甚用苦參皮硝猪五爇水洗數次後用烟猪肉油擦

擦極効

腿上一切寒熱瘡用鴿子糞煨過爲末以好參加燥痛加黃丹少許

桐油調敷



醫方類聚卷之四

孫真師醫方中應回父家

手足

手足



手疔 附肩疽

癰疽各手皆發此症傷肝胆小腸經患于手背及指間或如黃豆  
大或如聚粟或如熱棉拔之則絲長三四寸要知不赤黑者阿其  
狀黑者死凡人病手發如風熱血燥筋急者宜耳牽內加味  
如因怒火而疾者川芎疽內柴胡清肝湯前服

如丁者厚杜麻縮宜腎氣丸之類忌寒涼降火之藥及艾炷灸  
症皆犯之則輕者反劇重者大潰腫痛發熱出血而死悔之  
氏治手皆發用痰核肉十六味流氣飲解毒生肌之藥

甲疽

疽之症乃毒氣攻于手足指努肉暴上指甲疼痛出血瘡中有

更或因剔甲傷肌或因甲長侵肌遂成腫痛

若疽俱用綠凡五兩置鉄板上以炭火烘之吹令火熾其凡即

溶流出黑汁者是頂候流汁盡去火待冷取為末色似黃丹取

之先以鹽湯洗拭後用綠凡為君入射香少許敷之重者用綠

凡五錢蘆薈一錢射香一字為末以絹袋盛藥納所患指于袋

中線上定以瘻為度

指指頭先腫煖熱掣痛狀如以爪甲中結膿甚者爪甲俱痛

治宜先用荳蔻煎湯淋洗狀後用烏梅核中仁為末米醋調

膏入治潰之自愈或用猪脂和蚯蚓搗爛敷之

腹肚了口治宜天南星五倍子白芨草烏大黃酒麴酒糟搗爛  
交方初起用野茅煮塊收煉或酒糟半盞曲果四個紅豆半盞  
醋半盞其搗爛卷之

天蛇頭

蛇頭瘡生手指上或足指上瘡傍一塊開口腫痛是也治宜用  
蛋一個蛋搗碎一宿如指頭大將人言雄黃粉五八手蛋內  
後以患指入于其中浸一宿次早更以蜈蚣燒烟燻病指一二  
次即消

如痛甚流血不止用雄黃蜈蚣金蟻為末搽瘡頭上却以麻油搽  
帛上托之

又方 山砒霜醋收煉或先將麻油煎雞蛋搗手指一夜次日  
猪胆一箇將雄黃末三錢人言末三錢射分八胆內將雄黃

住一日疼痛極甚一日後去藥胆即好

此頭臭爛久不愈用杏霜爲末麻油調搽

此掌風癬治用川烏草烏何首烏天花粉赤芍藥荆芥蒼朮

羊肉地丁各一兩艾葉四兩煎水燻洗

一方用杏仁去皮尖輕粉等分爲末猪胆汁調搽患處炭火上炙

三三次將麥粒大的艾在扣指蓋處炙三壯水遠不發

如多年不愈者先用磁鋒磨盡次以草麻子一兩枯凡二錢爲末

桐油調搽火烘極熱再以炙肉三兩水銀五錢枯凡三錢搗爛

如泥每日搽手十餘下次以肥皂酒糟洗淨十次神効更炙勞

宮或內開一火斷根神効

一方黃蘗晒乾并苧麻子研火上燻之二炷香爲度

手癰瘡發如豆極痒濕如豆疥爛如浸淫瘡之狀治宜以

神凡托粉黃柏黃連爲末麻油調敷

紅絲瘡

紅絲瘡乃因喜怒不當血氣逆行而生于手足間有黃肉其中紫黑色即有一條紅絲通血上而生若至心腹則使人昏

不救或有生面三條紅絲者

治宜急以針橫截紅絲所到

處刺之令其出血以膏藥貼或嚼蒜草根敷之立愈

手足腫毒

治宜芙蓉葉草烏絲三天南星五苓大黃七怕絲

酒過三箇及頭酒糟醋調敷上

雞爪瘋

手足不能搖動不能拿物者是也治宜乾姜肉桂各二

五加皮海桐皮略一川烏麝香

牡丹皮川芎赤芍各五右為

細末每紅水一盞將占錢一文八清油為膏貼入此錢同煎如

婦人病此症用艾火在陰戶火處離一分灸一丸即好

牛勒瘋

是近手旁紅腫痛不能屈伸有似牛勒樣

治宜用四五枚布針畧蘸老虎葉針之即安若潰而膿出仍服

子宜散之類外燻洗化毒生肌

厥隻 是症受寒痰所發脾下核腫如雞子大


治宜防丰當歸人參小蓟土烏藥大茯苓肉木香川芎桔梗枳  
壳粉草乳香沒藥白芷羌活白芍蘇葉黃芩歸服如有潮加連  
荷無潮加官桂或用腦疳肉于金托裏散洗妙

狐臭 脚 腋 耳內多濕治宜密作僧一個研枯白凡紅辰砂硫銅

青白附子猪一其爲細末用皂刺煎藥汁調末搽兩腋下夜靜  
時先用皂刺煎水洗淨然後搽藥至一七又將大甘草一兩煎  
濃汁服之外用耳遂末細猪油調搽腋下日夜拔出身肉臭  
物再將枯凡一兩蛤粉研碎腦疳爲末搽之少許末去病根  
一方黑鉛二錢溶化入水銀二錢攪勻白凡三錢鐵銅青紅共爲末  
先將黃荆子洗患處後搽七次又一方用他僧一兩射香牛分  
粘丸一錢輕粉一分細末五分共爲末用口涎塗擦三日一次

天方每次用嫩黃荆表七個擦上後以小便洗上後用嫩松枝搗  
 爛投腋下每日換以小便頻洗至一七日又用田螺螭一個米  
 泔洗去泥水方入射八厘朋砂一分人言三厘于內用碗盛之  
 至晚放在屋上連露三四晚用螺螭水手蘸擦四五日即効  
 肩疽 痒而出水負擔者多生用石灰二兩火炒赤傾于濃醋內  
 內遂入水粉二錢攪勻以雞毛刷上數次即愈

脚背癢



人面癢

膝瘡

鶴膝癰

鶴膝癰症乃足三陰虧損風邪乘之以致內排炒食肌瘦肢體疼痛久則膝愈大而腿愈細有如鶴之膝然

初起宜用葱熨法以消滯之寒熱者五積散加散加烏藥薑黃如已潰者法活寄生湯膿滿肌肉不生者用慈惠八物湯

膝癰單方 用左纏藤三十餘斤銅內煮成膏以酒調開入





初傳治兩膝腫或兩足痿痛軟或沉重未痺不能

動併用後病此症者先服換藥散一二貼治以天防時獨

○換蘇散 吳興 蘇葉 路二 甘草 陳皮 各 錢姜 葱白 煎

○天防風湯 當歸 川芎 白芍 淮地黃 人參 黃芪

白朮 羌活 防非 牛膝 杜仲 杜草

○虎圓製治合膝瘋 用脂杉節 暗松節 茄根 海桐皮 川

青藤 五加皮 羌活 独活 當歸 川芎 白芍 厚桂

黃芪 杜仲 牛膝 南星 半夏 陳皮 枳壳 石南藤

細辛 秦艽 白朮 防辛 乳香 沒藥 木瓜 槲榔

甘草節 蒼朮 生姜 奴酒 空心服不効再加川烏 姜汁煮

草烏切碎 滾濃茶泡過

○過膝瘋 天過膝瘋症石脚先病愈而左脚復疾或左脚先病愈而右脚復

百病全書卷之四 一 過膝瘋症 五

病是也治宜以 大參 黃芩 牛叉 苦參 朱苓 當歸

桑寄生 茵陳 陳皮 防丰 白朮 知母 羌活 蒼朮

獨活 升麻 白朮 杜草 生薑煎服

如虛兒傳治膝頭腫痛用朱苓 定舍 板郎 小商 牛膝肉

慧苡仁 各 兩 古南藤 獨活 杜仲 各二兩 木瓜 一兩 羊耳

附入 各廿粒 七錢 爲末 每空心酒調下 三小

婦人月經不調發熱口渴面膝腫痛者用耳類道邊散加牛膝

神黃柏

鹿角製治瘋發脚痛不能動者用當歸 川芎 白芍 白芷

厚朴 枸杞 杜仲 故芷 木瓜 牛叉 防丰 預仰

防已 羌活 杜活 蒼朮 乳香 沒藥 杜草 真荷生

薏以仁 土烏藥 土茯苓 姜生 虎胓骨 絡等 製成散

楠木香 生研 同生酒 開藥服 每早用雞子下 外用 牛膝

是症兩脚痛如搗鼓然宜以地龍 防手 羌活

虎骨 虎脂 乳香 沒藥 白芷 山甲 虎胫骨 紫金

入面瘡

腎藏氣

是症初起兩足時熱脚根作痛多干內脛或臍上痒極抓破成瘡  
如疥癩痒滴膿水久則能漸延開失治延及兩股遍身者有之  
如內症肺熱盜汗口燥咽乾吐衄熱夜腰膝倦怠治宜以腎囊類

腎氣丸為主佐以四生散

四生散 獨活 黃芪 白附子 皂角刺 共為末薄荷

又有遍身生瘡膿水淋漓兩腿尤甚不能行經年不愈乃腎虛

也宜非應類八味丸主之

外治白膠香散 赤石脂 芫花 蘇合香丹 沒藥 乳香

輕粉略一為末荳蔻或油搗搽

外腫癰初起用獨脚烏粒或眼藥三七 生地 梔葉表

茶葉共搗爛每口一換搽茶洗不効或用標術 龍骨 乳

香 沒藥 兒茶 黃柏末 血竭 鮮豬肉 輕粉 五

冰片 紅雞子油 黃白蠟 路一麻 桐油 路非 棧油 一堤已上七

味為細末輕粉片脂飽湯先將各料黃白蠟溶化去渣將七味

入銅內熬沸數次攪起頑火碗內候冷將輕粉在內調攪

將冰片在內攪膏每毒但胡一之東各一日一換

應貴製治腫毒神方  
用黃蠟兩兩開化入黃丹一輕粉二攪勻  
作隔指膏貼絹片緊扎三日一換每先以鹽茶洗之如貼膏  
白將愈則以黃丹輕粉為極細末一撒即乾水結益神効  
又腫瘡作痛者宜用諸般神膏類金華隔室膏或四應膏神効  
瘡作痛者宜用五仙隔指膏  
須臾久不收口或爛痛具瘡法當貼隔指白玉膏內服蠟丸丸之  
類且翹足端坐勿多行復庶可全

裙襠瘡

裙襠瘡亦生于脚脛或因打撲而成其瘡口狹皮肉極潤皮薄如  
竹膜極痒痛終日黃水流延蔓而生甚者數十年不愈又易染人  
患者須忌房室則易愈初起用塘內久浸過茶葉貼數次不効  
可用黃蠟二錢麻油一兩半火熬後入飛過黃丹二兩細火熬  
成膏隨瘡口大小貼膏如銅錢厚貼之或用四應膏亦妙

婦人裙襖用紅花子枯凡五倍共為末鹽

向前瘡治宜黃連五錢牡礪八錢為末井水調敷或用松香黃

蠟溶化為膏貼以絹巾緊扎煎茶洗一日一換七日全愈

脚肚上瘡初如粟瘡大抓搔不已成片黃水流出色不可忍先

用貫衆煎湯洗後用百藥煎為末津唾調敷自外而入

脚癰腫痛作痒抓破汁流或封撲成癰治宜猪尿火服栲樹絡五

片腦分花柳龍骨等症有膿水加輕粉如濕則換乾則麻油調

脚眼瘡

脚眼瘡症通腎脉發源腎經過脉內因飲食起居虧損足三陰所

致或被火死所咬而成也

是症慢腫少食者且紫疽類補中益氣湯咳嗽吐痰者宜赤廔

類八物湯加羌桂或人味丹外治視病而施若久不愈即瘡

蟬發初起者宜用石蠟蟬打爛搗或用小田蟬燒灰一面搽

黃一兩硫黃末五錢輕粉三錢乳香沒藥各五分將黃蠟二兩

熬化調前藥作隔扇膏貼或以萬應膏久貼後脫生肌

服痰核內十六味流氣飲加減煎服

蠟 獅骨腫痛不可忍者外用生薑葱白醋搗爛敷患處內以當歸

川芎上烏藥木瓜槌即海桐皮秦艽獨活中桂薔朮威靈仙黃

柏生薑蘇葉煎服

蠟 因跌破成毒紅痛腫爛用細茶嚼爛併將芝麻川椒爛罌如

此二次內白蔘麻茶白芷霜煎水洗或麻油茶百草油搽

蹠上先一孔約深半寸至下半日疼痛與者此濕毒生成漏也用

人中白或人中黃灸出水滴人瘡口

脚發

脚發之症生足掌或指縫間色赤腫痛膿稠者腐足三陰濕熱下

注易治微腫脹痛者腐足三明虧損難治甚則暗不腫痛不潰

三言卷之四

用石類

膝煩熱作渴小便淋瀝者陰敗未傳惡症不治

治法濕熱下注者先用隔蒜灸法及隔疽類不命飲以解蘊毒

一次用髮疽類補中益氣湯加小茴故芷以補精氣如三陰虛者

初起用方括內托裏消毒散或托裏散加牛夕板柳杜仲潰後

加鶴膝風內大防圭湯或赤應類八物加芪桂明虛心挑者用

常山川芎白芍大黃知母黃柏之類

脚背發

是症又名脫疽其原因

一房室損傷脾腎或先溺後發或先

脫者色赤作痛自潰加先用隔蒜灸內服腦疽類活命飲或

敗毒散加銀花白芷黃如痛止用托裏散扶氣者用痰核內

下六味流氣飲下虛者用八味丸或八物湯加芪桂

重者色黯不痛先用隔蒜灸更服補藥固內則惡肉不致上長

庶可保生矣



又有外塗生肌涼藥內服結毒兼疔房室則患處不潰不痛色  
上延亦多致廢重者不用利刀解去其筋則筋骨出而毒得泄  
或甚在指則斬去其指在肉則割去其肉外治用桐油及無名  
異煎一沸入花椒一勺看瘡大小麥花在内同煎浸一七後  
以此藥貼瘡土即安

嵌甲

天衣甲之症多因融家研損爪甲端入四边腫焮黃水流出浸淫  
相染五指溫爛漸引上脚疾清渠四起如湯潑火燒日夜倍  
增不能行動治宜以陳皮濃煎湯浸良久甲肉自相離開輕手  
剪去肉中爪甲外用蛇退一條煖灰雄黃四錢爲末乾參乾者  
香調敷與川直條未治

甲生肉刺 是疔手足甲忽狀長倒生肉刺如錐痛不可忍治宜  
用藥菜多吃自愈

脚打咸泡 治宜以井水調生麪粉貼過夜則于不可穿破或用

水浸過新松樹嫩皮貼

脚指牙瘡爛濕 治宜以枯凡三錢黃丹五分爲末搽之或鴉掌

黃戊燒灰搽之○一入病梅毒後脚指了生瘡濕爛臭穢子用

象皮浸惡枯凡胆凡步過黃丹爲末搽數次而愈

經搔痒成瘡血出不止 治宜以多年糞桶箍篾灰敷之

指上及指縫中沙瘡爛者 治宜先以鹽茶洗上後用燕窩泥厚

炒和黃柏爲末香油調敷痛者加乳香

脚上松皮爛方 治宜用黃柏黃芩黃丹各一大黃細防羊

石兩樟腦茄凡松香水粉磁黃芩四錢木油揉油調敷

脚瘡似松皮爛單痒出水用桐葉水煮將葉裏脚裏乾又換

脚瘡似松皮爛單痛不痒流水不乾用山上經過久霜露牛糞

灰麻油調敷

脚瘡作痛

治宜以乳香沒藥桂枝各二錢茶瓦片晒拌水銀粉

共為末用蠟同清油少許溶化調搽如瘡口大紅痛先宜用

一臭桐枝水洗後擺前藥

兩脚生瘡甚者治宜用蜈蚣油一斤以川黃連配同熬酒空心

服外貼五油膏或先以楊梅龜金良花嫩楓葉苦參煎水洗後

用黃連二分黃柏一分黃升大黃礞石粉和冰片分共為末擺

脚上瘋瘡癰毒治宜以防丰當歸白芷黃芪獨活

一茶朮牛夕防已川烏草烏燐板桐木瓜威靈仙

石南藤五加皮何百鳥一亩木香生研大甘草湯煎服

脚瘡有孔出水治宜用只母一茶白九兩雄黃紅共為末擺

每以苦茶先洗

遠年爛脚

治宜用老松樹皮燒爛牛皮燒鳳凰窠黃竹箬

硫黃蛇

脚烏桕根蛇床子雄黃各為末木油調塗或

辟膏白王

少

又方用挑菜麴包七次應用白果葉

脚因不碎破成瘡

治宜用青龍糞熏焙乾為極細末桐油

脚聖毒

是症人脚走長路被石子脚底墜腫不能行走痛不忍

治宜用舊草鞋浸尿桶內一夕或半日外用新磚燒紅將浸草

鞋放磚上以腫脚踏定火逼尿氣八裏即消如走長路脚腫痛

者用此方亦妙

遠行脚上打損用雜草燒鏤綉和飯粘研成膏貼之用帛封上若

打泡用油線穿過兩頭男斷亦用纓綉飯粘貼之

遠行脚心腫痛用蚯蚓敷腫處高閣起脚一夕即愈

脚疔俗云雞眼男婦俱有之但用福州滅水浸蜈蚣末調搽

眼上即時自落

脚出汗用白九于葛煎湯頻洗

○通身部

通身流注



治宜直毒行血用瓜蒌根酒煎入乳香沒藥五靈脂皂刺等分  
 以下其毒次用清心行血之劑如係蛇毒并足蜈蚣咬妙雄黃  
 白芷次之或蠟斤九令酒入射香送下外用荆芥白芷川椒蘇  
 白煎湯入鹽俟湯溫白手臂上盪下一日三次其標疽毒氣走  
 腫所至處宜緊繫之自手發者毒走至心自足發者毒走至臂  
 不救各有小紅筋尋其筋之住處炙三炷即瘻經云在指則截  
 在肉則割恐毒氣入心入腹令人煩燥喉啞昏悶或捺出清水  
 機汗者皆極重也死入至速此症極虛引風癰疽開一寸則一

寸引風非必風入于其中風邪襲虛則肉爛透骨也血橫流宜  
南星半夏白芷稍最能去風可以頻敷其諸癰疽推

癰發

凡瘡氣血相搏有頭有面風邪內作無頭無面若癰無頭無面  
裏開瘡低貼肌肉走注牽連生於手足或掌心得腰腿等不伸  
縮之處初起渾身壯熱手足不遂增寒頭痛虛渴多汗喘逆四肢  
沉重較之諸癰煩渴為甚或腫毒已平數月後復於抽是大癰但  
作肉色微帶淡紅終不能收大要培養肉氣以防潰瘍如瘡出米  
泔汁者必死治與癰疽類推

癰毒

癰毒之病多內因飲食熱毒外感寒氣暑氣而成治亦宜詳因  
而施癰毒內消治宜以當歸尾赤芍稍白芷稍一防牛肉  
石乳香 追殺藥 川山甲 連高西煎服如癰毒在上

一升麻或黃柏一五倍子三其為未酣調敷

治用

流者行也。注者住也。或結塊或痼腫皆因素有痰火。或外感風寒邪氣流行至其痰注之處而發。或內傷鬱怒以致痰火聚於內傷房室陰虛陽氣衰。逆於肉理而成。或內傷勞役飲食不節動而發。或跌撲閃挫不時逆血凝而成。或產後惡露水盡後破感傷凝注多生四肢或胸腹腰臂關節之處。

初起宜用慈靈法。寒者用痰核內十六味流氣飲。虛者大頭風內六君子湯加芎歸。或癰疽內補中益氣湯加木香。已潰選用。令其自潰。自消。若日久不斂者。論有表邪。只托裏為主。以承癰內八味丸。人物湯加芪桂。或腦疽癰疽托裏益氣湯更佐以豆餅祛寒和補接湯。膿成以火針破之內有膿管。以赤小豆入。應園製治流注初起者。仙毒在土。以升麻為主。毒在下。以羌活生。

一 藤木瓜為主佐以土赤芍川黃連白芷稍何首烏經板壳小苗  
 香土烏菜落歸尾川独活大粉草牛水牛酒煎以發根泡服  
 疾痘又名蛇瘡

是症痼瘡地面多有之先作點而後露肉四畔若牛痘黑硬小者  
 如粟如豆劇者如粉如李發無定處或臂或臂或口齒或肚脰多  
 見手足指間赤黑毒白色變不常根深八肌走腎遊遍毒血流注  
 貫串筋絡爛肉見骨出血極多令人串痛狂言痛八千心即死矣  
 出於外腎亦死原因屢受惡風入於脉理或烟瘴地面傷寒瘧後  
 及感觸蛇毒所致二十已後四十以前皆積傷之毒入胃壅聚而  
 成四十以後六十以前乃血閉不達熱積而得之  
 如癰毒生于脚腿肚上俱有者宜荆芥牛夕 葱以仁 川羌活  
 一 川厚朴 杭白芷 尖換柳 官桂 蒼朮 枳椇 枳 陳蘇  
 一 硬 南木香 大封草 酒煎服七八貼而愈



如暑日男婦小兒諸類生癰 治宜用香茹 扁豆 白芷和

厚朴 黃連 羌活 防丰 連翹煎服五貼或外用木槌花

如癰毒痛腫不用刀針只以新搗生的卵壳燒灰存性用調至

如癰毒膿欲出不出宜以敷鹽柴根老鴉蛋二味放水煎口吐

出膿 如癰毒膿不干宜用雞萊打爛同蜂蜜調四弦敷

癰毒外治總方用芙蓉葉白馬尿白芷山批細葉松木皮共為末

生癰 用陳早古谷存性為極細末有冰乾搗無水麻油調搽不

過五六次即愈

一方 用鯢魚牙齒燒灰蒜油調搽或獨子肥皂去子入盞子內

二天燒過為末麻油調搽

又方 用筋過石灰 少赤與枯凡及糯米飯搗爛搽上

如多年不愈者用猪頭上毛猪鬃上毛各一握燒存性鼠尿一粒

輕粉少許共為末用調敷

癰疽 即癰疽 又名大痲瘋

是亦受天地間肅殺風氣酷烈暴悍最爲可畏一因風毒或汗山

帶衣入水或酒後當風二因濕毒或生計濕地或冒雨露三因傳

染未必皆由針也四傷飲食熱毒遍甚大集大熱房勞穢力以

紫火動血熱更加外感風寒冷濕而發初起身熱上熱房勞穢力以

紫如癰疽風熱或發不流膿上熱房勞穢力以

紫如癰疽風熱或發不流膿上熱房勞穢力以

紫如癰疽風熱或發不流膿上熱房勞穢力以

紫如癰疽風熱或發不流膿上熱房勞穢力以

紫如癰疽風熱或發不流膿上熱房勞穢力以

紫如癰疽風熱或發不流膿上熱房勞穢力以

紫如癰疽風熱或發不流膿上熱房勞穢力以

紫如癰疽風熱或發不流膿上熱房勞穢力以

紫如癰疽風熱或發不流膿上熱房勞穢力以

紫如癰疽風熱或發不流膿上熱房勞穢力以

減一半只服後藥

防羊肉

荆芥穗

淨連翹

白炭荊

金銀花

海桐皮

白麝皮

何首烏

百病藤

夏荆子

威灵仙

皂角刺

石菖蒲

上牛久

宣木瓜

慈以仁

大椒子

川續斷

上苦參

胡麻仁

當歸尾

白芷稍

川黃連

赤芍稍

川独活

比柴胡

人甘草

湯加天

花粉并

草少下

不記貼

數每黍

醇酒同

煎多服

切忌鹽

併名毒

物若有

蒼布荷

葉同芻

未塗上

自愈

如虛兄

傳治厲

風症肩

毛脫落

鼻聚倒

塌遍身

生癰者

聖化丹

防手

荆芥

羌活

独活略

胡麻妙

金毛狗

苦參祛

牙皂祛

皮當歸

名牛蟬

退羌活

妙金毛

狗頭自

何首烏

祛步

各當歸

名牛蟬

退羌活

妙金毛

狗頭自

搗爛如

泥同藥

和可將

陳米飯

打糊為

丸如梧

是六分

至五十九如病人身上骨腫肩止或風氣按痛手足拘牽先服此藥一料將青茶送下口進四服或婦人齒腹麻痺手若刺痛腿膝生瘡先服奪命一料後服此聖化丹服藥後十日再鋒面上放血次干脾上放血後干腿脚上放血而遇天氣清明五六日放一次量病輕重不可亂放血若婦人多破血癆祖傳用吹別子步泡草烏少老公續妙川烏池細草青木香夫黃肉桂略一宮蒲酒耐雄黃仁蜈蚣一條以青竹蛇一條共為細米酒打糊為丸如桐寔大每服五十九丸白湯送下王氏傳用川芎王地當歸赤芍白芷羌活姜蚕疾莉蟬退天麻黃柏烏藥荆芥防手燈黃胡麻子威天仙川山甲石菖蒲金銀花五靈脂絡一白蛇酒為細末老米打糊為丸如梧寔大每服五十九丸白湯送下

吳氏換肌散 治癰疽年深不愈以致眉髮脫落鼻梁崩損重者

方可服之 烏梢蛇 鱧白蛇 蛇頭地龍 略一天麻 細辛 白

芷 蔓荊 當歸 苦參 甘菊花 荆芥 威灵仙 川

木賊 紫參 沙參 甘草 川芎 赤芍藥 胡麻 石灰

木通天門冬 蒼朮 木別 定風草 何首烏 紫苑 茯苓

石菖蒲 草烏各一 而其各製過為末每以五錢 溫酒調服

楊梅瘡

楊梅瘡之症由肝腎脾內風濕熱之毒間有天行濕毒傳染但形

如楊梅嫩紅濕爛痒痛屬心多生乳筋形如鼓釘黃豆者屬脾多

生滿面謂之大風豆形如綿花屬肺多生毛髮形如紫葡萄按之

緊痛者屬用腎多叢生豚臂及筋骨之處如發髮鬚額日鼻殺道

逆者屬陽明及少陽太陽如發于足脛陰莖脇肋者屬肝腎經纏

陰大抵上先見者氣分受病上体必多下先見者血分受病下体

必多上下俱見者氣血俱病

初起即服方括內防風通聖散一

一

貼去麻黃用硝黃以去內毒待胃氣稍定再以一貼去硝黃用

麻黃發汗以去外毒已後用薏以仁 歸尾 小荷 牙皂

制芥 銀花 木通 牛夕 薤皮 羌活 獨活 木瓜

防丰 甘草 各二錢 上茯苓 一分作六大貼酒水全煎服外用

輕粉 三錢 油內久炒 銀硃 一錢 油內久炒 鉛粉 五錢 硃銀 小鍋

內煨至黃色胆凡 分杏仁 二十箇 去皮火帛搗去油其為末

或麻油或猪油煎搽 紅花防風天花粉金銀花每貼土茯苓

應圖製治梅毒神効用 四兩全煎空心服外用 杏仁牛夏 各一錢 輕粉 仁為末猪胆

汗調搽如生在玉莖上爛而痛者仍先服下藥二貼後服川草

薤 三錢 金銀花 三錢 山慈 二錢 紅花 紫草 各一錢 烏梅 四箇 共分

四貼每貼用灯心全 煎服外用杏仁 去殼龍牙 即龍牙

煎服外用杏仁 去殼龍牙 即龍牙

粉一水片匙共爲末渴則攪乾則用猪脚上火筒骨髓調搽

如瘡似靴釘及掩蓋厚者用人言錢爲末以小紅束去核搗爛

包人言八炭火內煨過爲末猪胆調搽

如虛兒傳水火丹 牙硝 青凡 白凡 淮鹽一水銀五錢

硃砂礪砂各半米片 舂共研如泥不見水銀星爲度用硃舖沙

窩一箇燒紅入前藥溶化起泡望閒待冷用粗大碗一箇將砂

窩裏干碗內以火帛作條塞四圍用瓦打破取三角曰圓掛佈

周密以炭火四圍堆過砂鍋又用脚盆注水將大碗置盆內水

淺大碗半寸許即發火扇紅俟盆內水熱住火候砂窩冷取起

砂窩起大碗上丹砂收貯每用三分搗飯爲丸七粒每日一丸

羹湯送下外仍用此藥凝細茶調搽治梅瘡神効

如梅瘡爛成窟者用兒茶 小兒骨 芙蓉葉各五 赤石脂二分

硃砂分輕粉 乳香 沒藥 各二 蜈蚣 共爲細末 但每

先宜苦參 荆芥

花椒

煎水洗

如生梅毒服藥百餘劑

還有二三枚不愈者用好膏藥一兩張

入銅青胆凡兒茶朱

砂各一錢為細末攪勻抹厚皮搽貼之

如病梅毒服上茯苓大

便緊閉者用川椒貴公猪大腸內線扎兩

頭收熱去椒服湯腸

如梅毒傳經絡作筋骨疼

痛用川芎 當歸 熟黃 白芷 木通

牛膝 醋一白木銀

皂角 厚桂 拱柳 五土茯苓 全煎

上午服三碗下午服

三碗服至二十日自愈

但瘡愈時若体厚是者

用防風通聖散加減調理若体薄虛者用

當歸 白茯苓 醋一

荆芥 薤皮 乾姜 蒼朮 各八川芎

白芷 肉桂 木通

木瓜 黃芪 白木 桔梗 銘七 赤芍

厚朴 牛膝 麻黃

一皂角仁 銘五 粉草 銀姜 煎分作數點

服以此調理斷根



梅毒

楊梅毒症乃因失治入則風毒深入經絡或挾人而成頑癰或如  
血腫敗而成瘡或誤服輕粉水銀不遵藥戒而成風腫腫爛流  
膿出汁謂之惡病至於此亦有輕傷眼鼻腐爛玉莖與魚口  
出薄楊梅結毒用當歸煎牛膝一正在此能骨痛者生地黃  
牙皂能防手一荆芥略一金銀花此二種沉香少下土茯苓五  
右切片分作十八貼服三貼又服貼後遠服九貼服二貼間二  
口每貼用水四碗煎二碗分作四處服之但先宜花椒煎茶苦  
參煎水洗之藥完全愈妙不可  
如虛兄傳五寶散治梅毒如神用珍珠琥珀冰片皆西鍾乳粉  
一匙朱砂二匙先將土茯苓切碎絞汁又炒過飛麪一匙  
再放調前末藥貼在下空心服瘡在上飯後服外用五倍皮  
硝煎水洗七後搥解新生肌之藥貼太乙膏

應園製治梅毒風漏筋骨疼痛遠年不愈用冷飯團仁白薤皮

防風荆芥 五加皮 威靈仙 木瓜 蛤粉 白芷 當歸 川

芎 白芍 生地 續地 骨皮 尋風藤 牛夕 甘草 黃

連 白茯苓 槐花 少 略杜仲 細沙 皂角 仁白 牽牛 仁 分作

十貼每以水一鍾酒半鍾煎至半樣痛在上飲上服在下食前

服每日一服如初服三五貼其瘡腫似前是托出其毒輕者十

貼重者二十貼仍以藥渣晒乾煎水洗切忌房事生冷炙烤物

黃氏傳按此漏癰頭胸觸成大孔用青魚一尾五月五日午時破

去膿尿將茶簽草子放滿腹外以水數升同入鍋煮熟去皮食

之連服三五次即愈

妙皇傳拈痛散 治遠年近日生過綿花楊梅等瘡結毒五年十

年爛見骨背屈泡火腐行步艱難用 防丰 荆芥 連翹

皂角 麻黃 生地 熟地 牙痛

共為細末用土灰等二兩半每日服一貼服至七日見効

汪氏傳梅毒治方用白砒一水銀子老美一兩老鴨肫鮮肝山藥

研斷三味共研取汁先播爛祖同水銀入汁內用瓦罐張道

鐵灯蓋口用鉄線縛緊將泥至裏文武火昇以一炷香盡為

度后用原藥為丸白砒半分之林七分辰砂三分雄黃四分百

草霜紅靈藥各藥共為末煉至為丸做成十四箇每服二丸

白易送下神効無比

應園弟傳治遠年梅毒風症神方

白芍減天仙石南膝山果

水通絡五荆芥白芷梢

宜木瓜連荷慈以仁

土五加皮防風一麻黃六和

錢條共牙皂共為粗末切日用藥末五錢及土共

生地黄

耳枸杞他活羌活

天麻絡黃芪胡麻仁

土牛夕各一兩金銀花

白蔞皮小芳其草焙

用大罐收服

傷癰外治用生白果肉杏仁食鹽

搗爛別破癰窠或乳香沒藥

龍骨全蝎輕粉人言雄黃巴豆為未搽

如楊梅風毒及誤服輕粉以致筋肉疼痛不能動履或壞肌

傷骨者宜仙遺根湯

○仙遺根湯 土茯苓二兩木瓜

防風 木通 薏以仁 白

瘡皮各五分金銀花六分皂子四分共合一大劑煎服七半月

有效如氣虛者加參芪血虛者加芩歸熟地牛夕肺熱去土茯苓

然倍加薏以仁金銀花

如病梅毒後腫塊成癰宜仙遺根湯

○仙遺根丸 茯苓一片防風

木通 薏以仁 防已 白茯苓

金銀花 木槿皮 鮮皮 皂刺各五白芥子四錢黃梅

身為未瘡或以浸酒服切忌生冷雞煎炒茶酒房室一切

王氏傳一掃光專治梅毒瘡風癰男婦疥癩神方

白硫一錢硫黃一錢俱碾為末用生豬膏拌勻將帛捲定以

油灯上燃着取油調後和藥末輕粉一錢水銀一錢班貓法

熬膏一茶椀郎一錢磨製水銀白附一錢和搽上即愈

天庖

天庖瘡症內多白水按之不

如魚泡乃出風濕熱毒所致小

兒亦多患之

治宜以防風通聖散加減服外以馬錢子白及青木香研水搽或

蚯蚓糞略炒為末香油調搽或白果搗爛搽神效

百効全書卷之四終

新刻秘授外科百効全書卷之五

豫章儒醫龔君中應圖父輯

疔瘡

夫疔瘡者皆由臟腑積受熱毒邪氣相搏於經絡之間以致血氣凝滯注於毛孔手足頭面各隨五臟部分而發也其形如粟米或痛或痒以致遍身麻木頭眩寒熱時生嘔逆甚則四肢沉重心驚眼花蓋疔腫初發熱突起如疔蓋故謂之疔七瘡含蓄毒氣突出寸許痛痒異常二日間害人甚速內經以曰疔發於右鼻赤疔發於舌根黃疔發於口唇黑疔發於耳前青疔發於耳下蓋取五色以應五臟各有所屬部位而已狀或肩或腰或足或無定處如在手頭面背節間最急其餘尤可緩也近世多見因食瘟牛疫馬之肉而成此症其形有十三腫皆以形而名之耳一曰麻子疔始末極痒忌麻子油犯之多不救二曰石疔三曰雄疔四曰雞疔五曰火

疔六曰爛疔七曰三十六疔八曰蛇眼疔九曰益膚疔十曰水洗  
疔十一曰刀鑷疔十二浮鷗疔十三曰牛狗疔惟三十六疔最爲  
可畏其狀頭黑浮起形如黑豆四畔大赤色今日生一明日生二  
後日生三乃至十數尤爲可治若滿三十六則不可治矣又有所  
謂紅絲疔魚臍疔之類其名甚多其紅絲疔者或生手足間有紅  
絲一條急宜用針刺斷不狀其絲入心必難治矣魚臍者狀如魚  
臍也凡療疔瘡皆宜刺瘡中心至痛處又刺四邊十餘下令去  
惡血乃以藥敷之仍服蟾酥丸之類發汗諸疔各目雖多其治  
法畧固如身冷自汗嘔逆燥喘狂渴妄語宜視者皆可治氣內  
寇傳飛龍奪命丹治疔瘡發腦疽乳癰附骨疽一切無頭腫毒  
惡瘡服之便有頭不痛服之便痛已成者服之立愈此乃惡症  
藥中至至危者服之立安一雄黃二錢朱砂一錢輕粉五錢血竭  
乳香一錢沒藥一錢蟾酥二錢銅綠一錢胆凡一錢寒水石二錢射香五分

片臘紐蜈蚣一條去頭足 喝牛二十一

右爲末先將蝸牛連殼研如泥和爲丸如棗豆大如丸不就入酒打麴爲丸之每服二丸先用葱白三寸令病人嚼爛吐于男左女右手心將藥裹在葱白內用無灰熱酒三四盃送下于避風處以衣蓋裹之約人行五里之久再用熱酒數盃以助藥力發熱大汗爲度如重者無汗再進二丸汗出即効如疔瘡走黃過心者并出冷汗者難治病入不能嚼葱研爛裹之瘡在下食前服瘡在上食後服忌冷水王瓜茄子油膩雞<sub>雞</sub>難<sub>雞</sub>物<sub>雞</sub>不可<sub>雞</sub>食<sub>雞</sub>一切外治輕者單蟾酥爲末以白麴和黃丹搜作丸如麥米大用針挑破錢頭以一粒納入神効重者賽金丹危篤者用提疔鎖子賽金丹 明凡晒溶化入金丹紅銀釵攪之慢火熬令紫色先以針週週挑破用津液調敷數度無令瘡乾其疔即潰而不潰入信一錢雄黃硃砂各五分貼之治一十三種瘡如神



○提方錠子

用雄黃朱砂

歸三

青藍硫霜白

疔者輕粉班備各

好五蟾酥射香醋一草麻

其个

右為末用黃蠟溶化和丸梧

寔大捻作錠子將針刺破疔頭放一箇于疔上又刺四邊令血  
出水粉膏貼之

凡暴死者多是疔毒急用灯焰遍身若有小瘡宜急灸之并服前  
飛龍奪命丹亦有服醒者如偏僻之處藥難導達惟灸有回生  
之功若專疎利表散者危

多骨疽

夫多骨疽症由瘡久潰氣血不能營慮處久則腐爛骨脫出肉外  
治宜補脾胃壯元氣以疔癰類入物湯加芪桂外以附子餅炙  
或葱熨法祛散寒邪補接榮氣則骨自脫瘡自斂若有氣虧損  
其骨漸腫荏苒歲月潰膿出骨亦當用葱熨法若投以皂去則  
其氣益虛邪氣益甚鮮不有誤

翻花瘡

翻花瘡症因瘡將斂原氣虛弱肝火血燥生風翻一肉突如菌大小長短不一

治宜內服疔瘡類入物湯倍參芪歸朮出血乃肝不能藏脾不能約宜髮痘類補中益氣湯加五味麥門冬有怒火者宜耳類八味逍遙散若用風藥速其亡也汗多必脫發危哉

外治宜紫芩一味爲末猪油調塗週日一易須候元氣漸復膿毒將盡塗之則肉自白八不脫雖人復出若候用針刀火炙其勢益甚或出血如注寒熱腫生等症急補脾胃爲善若似蛇形長數寸者用雄黃末敷之

蝸瘡

夫蝸瘡之症生手足間相對如新葉莢庠痛折裂搔則黃汁淋漓有孔如蝸久而生虫

治宜杏仁乳香各三兩黃耆粉各一兩未用麻油三錢人黃蠟  
五錢溶化入前末煎攪成膏去火毒篋器收用

又方用燕窠取抱子處土為末乾摻每先用白芷大腹皮湯洗淨  
狀後敷藥

### 走皮風

夫走皮風症面忽爛紅而出水延至胸手俱生紅點如豆疹

治宜先以老鼠焚根刮皮燂酒服以消其紅如而上爛處只將  
生地黄汁搗毛刷上再內多服防風荆芥連喬蒺藜黃連玄參  
午莠子金銀花歸尾赤芍白芷粉草

### 走皮癰瘡

夫走皮癰瘡之症生滿頰項發如豆梅痒而多汁延蔓兩耳外肉  
濕爛治宜先以桑寄生桑根皮各一握白芷黃連各少許煎  
湯以綿蘸洗候血出盡拭乾次用皂莢麻竹葉俱燒灰存性

黃柏黃連樟葉白芷各等分爲末麻油調搽忌醋

侵淫瘡

夫侵淫瘡症初生甚小先痒後痛汗出侵淫濕爛肌肉延至遍身  
且從口發出流散四肢者或從門肢發生然後入口者重  
治宜每先以苦參大腹皮煎湯洗次用苦練根晒乾燒存性爲  
末者用調敷濕則乾疹

月蝕瘡

夫月蝕瘡症兩月盛衰生耳鼻面間及下部諸竅宜枯凡輕粉搽

白蛇瘡

是症有星尾殿似蛇形或前胸生至後背兒也

初起宜隔蒜於七寸上炙之仍用雄黃爲末酒調服之再以雄  
黃爲末醋調敷或內服三黃丸外用蜈蚣燒灰麻油調搽  
蛇皮瘡 治宜以松香二兩白桐子六箇搗爛搽甚妙

五疥

六五疥者乾疥癢痒皮枯屑起濕疥胃腫作痛久則水流如黑豆汁砂疥如砂子細筒或痒或痛孤之有心歟赤虫疥痒不知痛延便易於傳染膿瘰疥色紫稠膿色厚數痛皆由五臟結毒而發屬足三陰者尤多但瘡有過難分經絡必憑外症以斷虛實如癢腫作痛便秘硬發熱者為風毒濕熱如慢腫痛痒肺熱或時寒熱體倦少食便順利者為血虛風熱

治此五疥更宜分上下肥瘦如上身多兼風熱下身多兼風濕肥人多風濕瘦人多血熱瘦弱虛損腎熱火炎縱有便秘發熱作渴等症只宜滋陰降火器如秦艽耳連膏之類決不可純用風藥涼血傷胃而壞臟腑內服通屈方括內散血疎風湯或連歸湯氣虛合四君子湯血虛合四物湯風合消毒飲濕合平胃散外治搽藥通用合掌

辨風膏使異散洗藥辨其真和

參等分煎湯痒加蛇床到椒種如黃頁  
子散雲來傳治遍身疥疥紅年莖莖者

威灵仙 莖京子 何首烏 荆芥 苦參 右各等分爲

末每二錢食前酒調服日進三服忌發風物

洗疥藥 蒼朮 皮硝 花椒 舌參 水煎頻洗

燻疥藥 艾葉 雄黃 人言抄核桃声爲末捲作筒燒烟吐之

一掃散 治各色疥瘡神効

大楓子肉錢枯几錢疾莉 花椒 一倍子 鐵硫黃 雄黃

青儿 水銀略一人言其爲細木水油調搽

使易散風具要治乾疥諸瘡甚神更不廢本以便製膏 花柳

香附 伴棋柳兩蛇床白九兩共爲極細末枝桃油或木

合掌散加虎傳治乾疥諸瘡黃泡坐板其瘡俱効

樟腦 蛇床 白芷 花椒 蛇一白九經大楓子一子

其為細末油核桃肉為丸置手掌磨掠鼻嗅之

磨風膏

治瘡癰風癩諸濕痒瘡及婦人陰蝕瘡火丹諸般惡瘡

神効

蛇床子 鈺大楓子 杏仁 柏凡 樟腦 二川椒

輕粉

水銀 錫三 雄黃 五 硫 硃 共為末水油三同研為丸

彈子大磁器收貯每用少許溫痒遍擦

五癰

五癰之症乃血分熱燥以致風毒起於皮膚發則肌肉急疹或圓

或問或如苦梅走散風癰即乾癢搔之則有白屑濕癰如虫行搔

之則有汗出頂癰全肤不知痒痒牛癰加牛頸上皮厚目堅馬癰

癰毒白點相連 治宜通用前方括內防丰通堅散去硝黃加浮

萍皂刺水煎服久年不愈休感若燕赤頭癰九外虛者不可安

用風藥有虫者間服前方括內蠟九丸白癰癰併梅癰宜貼磨

口頭癰九

浮萍

茶木

茶耳

一若

參半

黃

三

附

酒糊為丸白湯送下

立應湯 蔓京 防牛 荊芥 苦參 蒼耳 黃桐子

勞子 胡麻仁 甘枸杞 余良石 白芷梢 蒼朮 連

土扶苓 羌活 獨活 三兩 同煎早空心服

治乾癬 用生薑一兩切片內夾鹽及鹽梅火帛包定燒灰為

末再入人言末仁擦甚效古方用復毒草烏恰二錢班猫七枚

生房木津垂調搽

癬 用枯九黃連露五胡粉黃丹水銀銘二為末猪脂油配夾

研令水銀星散盡磁器收貯搽之或用必効散川木槿皮兩班

雄雌牛不烘即水別五錢各雄黃蛇白砒各一錢右俱切成片另將

將藥水用鵝翎搽癬上百發百中

生癬 用牙硝胆凡白狀銅克銀花乳香沒藥銅青為末生桐



油調搽或用烏梅剉破蘸蜂蜜復入輕粉搽之古方用舊皮鞋

底燒灰存性人輕粉少許為末麻油調敷

馬瘡 併疔頭用羊舌頭根將竹杆穿起搗爛加明凡一又搗以

好醋調勻將夏布兜搽用濕藥內必効散亦妙

綿花癬 用鹼陀僧末搽用水龍骨燒烟煙更以桐葉煎湯洗之

我掌風癬 有虫吃開用黃丹輕粉各三錢猪腦頭燒油調藥

通用洗藥 用紫蘇樟腦蒼耳浮萍煎湯洗之或用骨灰鹽

如女手兩股間濕癬長四五寸時極痒七定極痛乃以利針

二痒時在癬上刺百餘下其血出盡盪湯洗之如此三四次方除

益濕淫于肉其血不可不針後服浮萍散出

浮萍散 治諸風疥痒癩瘡

浮萍 附當歸 川芎 赤芍 荆芥穗 麻黃 甘草 熟地

右剉二劑葱白二根豆豉五十六十酒煎至八分煎服此

水界諸瘡

宜用蛇床子荜芩草無夷仁能牙草陳末莫多

分爲末先用甜藤煎水煎水洗後用黃蠟煎南油調珠

瘰癧

白瘰癧 治宜內用嚼魚散或金櫻丸外治三黃散

蠟魚散 露蜂房仁將生鹽炙滿諸孔服火燒存性去鹽後用

胆九天花粉蚬退各等分俱爲細末均分用帛包三分將活蚬

魚一對同酒煮熟無風處細嚼連刺飲酒後痒自上而下

金櫻丸 傳何首烏肝胡麻仁一蔓荊子一牛蒡子酒炒白

荊刺兩錢耳于一蛇床子酒炒兒絲子酒破肉從容一牛夕酒

酢蒼朮一兩金櫻子酒炒苦參一右爲末麵糊爲丸如梧

子大每至七十九溫酒送下

三黃散 雄黃五兩黃芩五兩天南星二蜜陀生枯

略二右爲末先以姜汁擦患處去血藥末亦擦後漸黑次日再

據黑散則無恙矣

紫癰風 治宜用官粉五錢硫黃三錢為末雞子清調搽服藥粉

諸瘡

血風瘡症乃三陰經風熱鬱火血燥所致癰痒不常振破成瘡  
水淋瀝內症肺熱盜汗惡寒少食體倦所以不敢急用風藥  
治宜通用內服歸尾川芎淮生地赤芍浮萍等分或方括內括  
血疎風湯甚者紫雲風丸外治用簡易散大馬齒膏或五疥內  
摩風膏

紫雲風丸 五加皮二何首烏兩姜虫配苦參 當歸略二全蝎

正歸牛蒡 羌活 独活 細辛 防己 生地黃 白芷

黃連 赤芍 蟬退 枳實 荆芥 蒼朮 略一為末蜜丸

下火溫酒米飲在下

聖功散 煨石膏一兩黃子生共為細末猪油調搽

馬齒莧膏 馬齒莧 五寶黃丹 黃柏 枯凡 皂莢各三錢

輕粉 鐵桐油 諸椎油 昏上葱椒煎水洗

如因飲酒後遍身發而風瘡抓至出血又痛者用蟬退薄荷等分

一為末每二錢水酒調服即愈

黃芩 治宜內服防丰 荆芥 蒺藜 連喬 皮子 金銀

花 黃芩 黃連 苦參 煨尾 甘草 紫枯子 外川槐

花煎濃水洗洗後用檳榔碎黃磨槽油搽或用枯凡神曲川椒

硫黃水銀各一錢為末香油調搽

加遍身四肢俱生黃泡瘡有膿汁而痛者宜用防丰 白芷 木

瓜 七厘 阜刺 何首烏 風靈仙 金銀花 當歸身

甘草 連喬 黃芪 輕者八貼重者一二十貼外用硫黃一

錢 明凡錢五分生牛枯羌活 土粉 零 川椒半錢 吳黃 一錢 枝

子 一錢 大黃 錢 俱存性為末木油調搽或用簡具散俱妙

子 一錢 大黃 錢 俱存性為末木油調搽或用簡具散俱妙

諸毒瘡痛不可忍宜用 白芷 當歸 乳香 沒藥 川山甲

金銀花 各等分為末每服一錢姜湯送下

熱虫血風瘡癢痛不可忍或有時痒而難當者用胡麻油白凡一

牙硝錢大楓子兩蛇床子錢硫黃鉅人言此為未試

遍身作痒抓即出水作爛如癰先宜用蒼朮花柳各制雄黃錢共

為末搥爛艾葉捲筒燻上後內服防丰葵利婦尾干葛苦參胡

麻仁何首烏甘草四五味

毒瘡水不乾者用黃丹輕粉仁僧寺分搗或用猪胆調搽

瘡後遍身生瘡內宜用黃連枝子大黃猪油四兩收酒服外

凡火共燥遍身生瘡甚者乃血虛也宜用當歸脾猪油脾生酒十

餘斤封固火煨一二時候油冷化退火氣每日隨量飲之

口難治部

湯火傷

凡遇湯火所傷先以鹽末和米醋調和瘡上次以醋泥塗之其  
醋塗不絕暫救痛苦一面急搥生地黄醋調敷瘡上直候痛止通  
厚至數不妨慎勿以冷水冷物冷泥熨之使熱不能出爛人筋  
又方用陳壁土真豆粉猪麻油并水各半調敷或用舊杉木屋  
桶板燒灰研并水以包頭山蓋患處以水刷上立効或用水銀  
二分津制死用鮮猪油二兩取油去渣同水銀連攪勻放亦  
退冷人冰斤半分輕粉乳香兒茶珊瑚砂各五分爲末搽  
李氏以清烟膏用雞子清磨京墨塗患處上用三層溫帛蓋則不  
起泡冷如冰効

錦鄉傳湯火神方用真鉛粉鴨蛋白調搽外用微兒肚下中  
毛細上剪爛鋪上即愈

子曾治一人因炒硝黃被火傷遍身外用陳杜黃金烏桕嫩反百  
草霜爲細末攪麻油抹內用解毒湯頻服七日全愈

治火呪云龍樹王如來授吾行持北方壬癸焚火大法

王如來吾是北方壬癸水收斬天下火星辰千里火星神必

降急上如祥令呪畢即握真武訣呖之即用少許水洗雖火燒

手足成瘡以療矣

杖瘡

杖瘡之症宜先破瘀止痛後宜定心補益如杖瘡忽乾毒攻腹內

恍惚煩悶吐瀉者難治

一杖畢即飲童便和酒不可吃茶免血攻心外即用熱豆腐鋪

在杖處其氣如茶其腐即紫復再易熱豆腐鋪之以紫肉散盡

紅淡為度或用蜜佐僧濃研醋開麻油雞毛刷乾則又刷神効

或用菜豆以微炒雞子清調制。或水粉一兩赤石脂水銀

為末麻油調成膏傘柄搥貼緊縛如肉陷用此膏填滿尤妙

又法打傷皮不破肉損者用蘿蔔搗爛卷之

內用只壳

木北仁

大黃

歸尾

黃芩

枝子

桔梗

柴

枳 木通

車前

甘草

忌葷三四日

體薄者去大黃

若體

薄者

瘡寒熱惡心少食宜

瘡者瘡

寒熱惡心

少食宜

歸尾桃仁赤芍烏藥香附蘇木肉

桂柴胡

活水酒煎氣

臂加木香心腹

脹痛加童便心下脹滿

氣不通暢

加香

宜棋柳

如極甚者外貼膏

藥

用白凡一

兩

秋冬用白凡四

兩

公羊油半斤

水一盞同煎取油

與蠟成膏俟

客温入片腦

滿腦

絡

玉

射

二

砂一水銀

輕粉

金銀箔各一百

同攪勻或搽或貼

內服乳

香

當歸

白木

白木

白芷

沒藥

羌活

甘草

為末酒調服

隨以熱酒

盡量而飲

虛者

遺後宜

補氣血

脾胃

雲林傳

退血止痛散

一治

杖後腫痛瘀血不散

氣血以心或胃寒

壯熱

歸尾

赤芍

生地

白芷

防丰

荆芥

羌活

連荷

黃芩

黃連

黃柏

大黃

枝子

薄荷

枳壳

桔

百病全書卷之五

杖後腫痛

杖後腫痛

杖後腫痛

杖後腫痛

杖後腫痛

杖後腫痛

杖後腫痛



梗 知母 石羔 車前 甘草 水煎服

劉文庵傳金蒲散 治杖打極重痛不可忍昏悶欲死者

白蠟生研乳香錢沒藥錢金蒲錢銀蒲錢右為末每一錢

林待即傳敷杖散 專治杖打重傷成坑日久不愈神効

用太桐子葉取茂盛者不拘多少以米醋煮至爛熟陰乾臨時

隨大小剪貼

如虛見傳補氣生血湯 治杖後清爛久不愈者

人參 白朮 茯苓 當歸 芍藥 熟黃 陳皮 香附

貝母 桔梗 甘草 往來寒熱加柴胡地骨皮。口乾加五

味子麥門冬膿清加黃芪。膿多加芎藭。肌肉遲生加白

內府秘傳二黃膏 專治杖瘡打成坑肉皆朽腐者神効

黃柏 枝子 連翹 黃連 大黃 苦參 荆芥 薄荷

牛蒡 比利 威靈仙 蔓京子 右為散各時分將清熱

慢入於瓦器內後乘熱入細葉在內龍骨煨  
溶傾入磁器內後乘熱入細葉在內龍骨煨  
輕粉 乳香 沒藥 白芷 大黃 雄黃 樟腦 水銀  
銀珠 射香 各等分 入內攪勻收貯服用  
鬼代丹 乳香 沒藥 自然銅 鐵樹木別子 夫克無名異  
地骨龍 杜名 右為末 陳蜜丸如彈子大 每服一九溫酒下任  
打着不痛

行杖散 方用白塊石細止切爛淡酒淬入碗內服之打着不痛  
折傷

大打跌損傷者此血氣在身不能流行因此或成血片或血死不  
通者或昏悶不醒人事或寒熱往來或日輕夜重變作多端致令  
血氣不調作梗故也医者不審原因妄投藥劑枉死者多矣誠可  
惜之當時當下貴得其宜或受傷至半月終死者死血已固不能

通水道既表後再不可復表但看仔細輕重吃藥吃藥後受傷處  
源須青腫紅色者此血活將愈如傷重復來將愈月熱法後服  
千金不奪散浸酒服盡之後庶得全愈如病人攻重牙關緊急將  
死者宜整開牙關將返魂奪命丹隨用正藥方內加羌活防手刑  
芥胡黃連煎既已人藥不死一不納者不治切忌當風處及地下  
坐卧井忌一切冷水冷茶冷酒之類油膩毒食之物如遇傷重者  
先令人解開病人衣服遍身始見者形色何如又要去魚際骨上  
下者有脉調和否如逆脉不至者死沈細者生山根紅除囊肉尚  
有子可治如腎子在小腹內夫即將莫區又用神妙佛手散如病  
急口內入藥不進可將太鰻魚煮熟取腦子和眼睛下藥末入  
藥路醒可故再用鳳仙子匙沉香研水吞下○從助食官既斷  
可治用桑白皮取絲縫密却將雞絮破開去食取膜上定患處  
得証藥護之後服藥可愈

一從助氣管斷即不治

頂門氣

破者未破者可治 食飽受傷 如三日不死者可治 頂門既破

骨斷入者不治 腦後受傷者不治 若心胸喉嚨青色未變者

可治 心受傷可治 心胸緊痛紅既裏心乃心口受傷不治 男

子胸乳受傷可治 妇人兩乳室受傷不治 正腰受傷重自笑

者立死不治 小用受傷上重吐衄者不治 氣出不收眼閉不

治 小腹受傷木傷壯者可治 孕妊小腹受傷犯胎不治 腎

子受傷入小腹者立死不治 腎子受傷皮破者腎子未上小腹

可治 如眼未直淚莫何害 脉太面緩洒四五不治 口如魚

口腥風不治 額門出髓即死 兩眼有傷可治 正心口青腫一

七內即死 兩乳有傷宜當急救而肺有傷可治 夾脊斷者不治

小腸有傷不分陰陽佳醫 頂門有傷難治 兩臂有傷怕血

五臟兩腿有傷須臾無事後必有損方具于後

○還魂奪命丹 專治跌撲打傷牙關緊閉心腹痛悶不醒人事

百效全書卷之五 跌打傷方類 十二

將茄竿開灌入碗即愈

銀絲草

有毛脚色生樹上葉長而毛雞子一個腿不月暗不二味

共研爛如泥熱酒刺起布

瀉通調小兒骨末一服即愈神效後

服袞義散○袞義散專治跌撲打傷遍身疼痛不能牽止者

三棱兩莪朮赤芍

西香銀玄胡子銀黃柏一槌研入房

青皮鄧羌活鉅防丰

大腹皮鉅大黃一芒硝三黃連三錢

桔梗二錢荆芥北

柴胡陳皮鉅紫蘇牛夏二里馬

再煎片用右法製法

如秤分五片葱白五根桑白皮牛水

牛童便前空心扶服十分汗大除此葱白只用一根如要

用大黃非確有痰用牛夏如孕妊受傷除三棱莪朮如血出

甚亦除之及葱白加當歸蒲黃用水煎服偏心受傷者加紅

花二分煎額門受傷三錢葱白加出血多就用止血金絲丹

如手傷斷用手摧正用酒心火吊捲定要厚寔停富外

皮押定進接骨回生丹再用小異脚緊七孔定杉皮乃無  
不愈但攻下之藥多加乳香沒藥痛重加西香二錢赤芍  
胡素乳香沒藥或有咳乃肺氣旺加乾葛杏仁勿用半夏  
貝母如重傷心痛加石菖蒲如原處痛今結痞痒加乾葛  
芍甘草桔梗防丰荆芥連薊每用原湯子煎熱服隨症加  
○通經活血止痛散、專治跌撲打傷敗血冲心胸緊痛者神効  
三稜 莪朮 赤芍 黃柏 黃連 青皮 紫蘇 野馬  
香附 北胡 乳香 初起不下此藥十分重者方下內加  
紅花蘇木石菖蒲

○仙傳火龍行氣法 生薑 酒食鹽 酒麻油 酒瑞香葉 酒大黃  
頭酒糟 酒京芥 酒澤蘭 酒生地 酒牙硝 酒共一處研爛以麻  
油炒熟帶熱熨上七八次冷了又炒熱頻七熨止自狀安愈  
後進千金不奪散及佛手散神効

○千金不奪散

防丰

京芥

生地

勾藤

角回

木瓜

芳芳

紫金皮

五加皮

白芷

栝柳

木香

羌活

独活

歸尾

天台烏

威灵仙

杜仲

芍藥

牛夕

乳香

沒藥

故芷

五灵脂

石南藤

自煎銅人熱者

加黃連赤芍為散各等分

每用頭酒一埕用絹袋兜宜浸五

七日取出隨量不拘時常熱服忌紅酒鹽鹹油膩等物如孕

婦服除牛膝赤芍加歸身比艾服此藥七日見功不問諸虛

百損遍身疼痛無不全効此方珍之

神妙佛手散

專治筋骨斷折金鎗重傷將死者總用此藥太

有奇功子孫宜珍室之

鹿茸

當歸

從容

禹餘糧

兔絲子

熟地

白芍

川芎

乾姜

琥珀

北艾

麝香

桑寄生

杜鵑

白朮

紫石英

五味子

酸棗仁

右為散依法各

分姜三片連二枚煎換勿輕用

○同春再造散一專治手足及筋骨斷折者神効無比

銅錢五文木香錢一自狀銅錢一射香錢一爲細末每服錢二無

灰酒送下令病人口先嚼丁香一粒乳香一粒方進此藥神

効傷在上食上服傷在下空心服如即日未安次日再服此

方如未斷折骨者慎勿輕用此方專能接骨別無奇妙

○同生續命丹專治筋骨斷折損傷疼痛不止者神効

川烏二兩草烏二兩五朮脂木別子骨碎補威靈仙

金毛狗自然銅仁爛地龍去土烏藥青皮陳皮祛

同香乳香射紅外子禾葉射香牛牽牛蠶禹餘

糧醋石爲末酒調服一錢神効後服再生活血止痛散

○再生活血止痛散治症如前大黃錢二柴胡錢二當歸錢二桃仁

仁紅花五天花粉錢川山甲錢甘草錢牛水牛酒煎空心帶熱

自功全書卷之五



○茲榮雙解散一專治打傷之後榮衛虛弱外受風寒內傷經絡

沒藥醋服為末水當歸白芷石連肉玄胡子川烏白朮銅

萬金不換乳香尋痛散專治遠年近日諸般傷損遍身疼痛

○者神乳香沒藥過血蝎鎔五南木香沉香當歸川

○芎白芷略甘草天粉木瓜肉桂略七独活羌活

○路去西香茴香略五草烏三錢腕右為細末每服四錢羌活

○同生再造散專治男婦跌打損傷遍身疼痛昏悶將危者

○川芎當歸羌活独活木瓜略一角回穿山甲

○小茴略五肉桂甘草鎔入川鳥砂川鳥三錢虎骨鎔五白然

○銅五鎔氣喘加沉香木香傷頭加肉桂前胡天麻肉從容夜

○卧驚恐加雄胆乱語恍惚失主加人參砂金箔銀箔遠達法

○右各依製法于肉未曾抄用半酒半童便煎服神効

○

傷骨碎接骨奇方 用甯歸白芷各三錢烏蛇各生爲末酒  
酒調服仁一覺身麻揣正斷骨端坐隨用糯米粥調牡研末塗  
傷處或用活生雞打爛貼外用杉木皮夾定繩縛毋令移動即  
服乳香沒藥白芍川芎當歸川椒各五白朮銅火煨過三共爲  
末用黃蠟二兩溶開入前末于內攪勻作丸如彈子大以好酒  
煎開熱服隨痛處側卧少時數進幾次大效如覺被傷風腫宜  
用南星防丰爲末溫酒調入姜汁一匙服仍用酒餅敷貼患處  
金瘡

一八騎馬跌扑被所佩鎖匙傷破陰囊二九脫落得筋膜懸繫未  
斷痛苦無任諸匠措手或以線縫其囊外加敷貼生肌痛不三五  
線爛而復脫矣予思常泊刀傷出血但敷壁錢而効敏蓋此亦  
傷破之類也是以令人慢上托上多取壁錢敷貼其傷破之處日  
漸安其囊如故

應員製金鎗神方

用女帶血勒馬片燒灰攪

或松香白凡寺

分為末攪

或牛夏

白蠟

為末攪

或生好石灰篩

過將韭菜汁作成清餅貼于陳壁土俟乾為末攪

或礬石灰

大黃切碎同炒七次以桃紅色為度研末攪

金鎗丹周梅江傳住痛止血生血

嫩老鼠

未主毛者

韭菜根與老鼠一般多石槽搗爛入嫩石灰

未干內搽乾作餅為度陰乾用時以刀刮藥末敷傷處

金鎗迎刀散

專治金鎗傷重出血不止者神効

白芍

甘草

水龍骨

右為末銅內文武火炒赤旋入大黃

末三兩

鳳凰退

以焦

為度復用嫩葉韭菜葉取自狀汁調

前藥陰乾後入杉漆一兩血竭一兩片腦三分牛胆南星一兩

野羊五錢遇傷處搽上一字立愈

新刻秘授外科百効全書卷之六

豫章儒醫龔居中應園先生

破傷風

內經曰風者百病之始也清淨則腠理閉拒雖有大風苛毒而弗能爲害也若夫破傷風症乃因事肇破皮肉柱上視爲尋常不察風邪乘虛而客襲之漸而變爲惡候又諸藥久不合口風邪亦能內襲或用湯淋洗或着艾焚炙其湯人之毒氣亦與破傷風邪無異其爲症也皆能傳諸經絡燒燎毒氣是以寒熱間作甚則口噤日加身體強直如角弓反張之狀死在旦夕誠可哀憫法當同傷寒處治因其有在表在裏半表半裏三者之不同故不離乎汗下和三法也是故在表者汗之在裏者下之在半表半裏之間者宜和解之又不可過其法也

口如聖散 川烏 草烏 各三錢 蒼朮 細辛 川芎 白芷

防丰各藥共爲末每服五七分酒調服忌油膩薑腥類  
如願狗咬加兩頭尖紅娘子各一錢口中風身体麻木或走痛  
酒調下○風旋頭暈酒調下○頭風茶調下○偏頭風口噤水  
搗鼻○傷風熱茶調下出汗○風牙止痛熨擦患處流涎○金  
瘡血不止乾摻之○惡瘡久不愈口噤水洗綿拭乾摻之○大  
咬蛇傷蝎螫口噤鹽水洗之仍摻上○癰疽疔瘡魚睛紅絲癰  
皆腦疽等瘡癰時新汲水調塗帛封再用酒調服○湯火傷皮  
新汲水調雞翎剉上○杖瘡破血乾敷之○瘰癧口噤水洗摻  
之○乾濕疥癬香油調搽  
○定風散 治破傷風及金刃傷打撲傷損并瘋狗咬傷能定痛  
生肌 天南星爲防丰帶匕山乙不煎防風各五分  
右爲細末破傷風以藥敷瘡口後以溫酒調一錢服○如牙關  
緊急角弓反張用藥二錢童便調下○打傷欲死但心腹脹者

以重便灌下二錢并進二服口懸狗咬破先嚼將水洗淨用蒜

口一字散

治破防風搗獨角弓反張

蜈蚣去鱗炒全蝎炒

頭右為細末如發時用一字擦牙縫內或吹鼻孔

口羌活防手湯

治破傷風初傳在表

當歸

川芎

白芍

防丰

羌活

稿本

細辛

地榆

甘草

治初破傷風熱紅腫風邪欲將傳指經絡而未入深

口水調膏

治初破傷風熱紅腫風邪欲將傳指經絡而未入深

者用杏仁

去皮細研飛白麵各等分

右和勻用新汲水調如膏付傷處腫消熱退

汪班

宜用密陀僧一兩

硫黃一

錢

礞硝二

錢

川椒

七個共為細

末將絹巾攤住俟洗滌後即篩于上二七見効或用雄黃硫黃

金蠟姜蜜白附子密陀僧各五分射香二分右為末蘸生姜于

患處擦之五日除根決効

去而臂刺字 宜用川山甲一片以糯米蒸如泥照依有字處擦  
帕包一夜次早不見

取聽神方 用雪白礪灰全煎銀炉內常在坐砂窩處久熱七  
匙調借彼銀氣以去黑也二味各等分隨意畧用水調成劑候  
成砂窩樣上一個下一个如盒子樣中入雪白糯米救十粒上  
下蓋足莫令走氣腰間再用原石灰及炉灰剩者封固放地上  
過一宿取起壁開取出裡面糯米聽用臨用時用布針拱破出  
血將製過糯米如糊樣點在痣上即時紅腫過一晚即去矣過  
三五日即合肉色

又方 用糯穉心灯火燒成珠以針撓破痣入肉即去或用巴豆  
油點痣上尤妙

夏暑心神益燥熱遍流潰成瘡遍身或出膿血赤爛如火

一 宜南星

生夏

黃連

黃柏格一五告子

黃丹路五

未乾慘如痒枯九雄黃常服黃連阿膠凡以清其心

熱汗浸漬成瘡痒痛不止

治宜黃芪

當歸

防丰

京芥穗

地骨皮

水通絡二白九

共為末每藥一兩水三碗煎五六

分濾去渣稍熱淋洗患處拭乾避風少時立効輕者只用蠟蜜

水和蛤粉敷之

邪座瘡

因汗出見濕而生輕者狀如散粟重者煎湯洗之或裏

葉亦好重者熱汗浸漬匝七成瘡菜豆滑石粉玉為末線蘸撲

之摩破成瘡加黃柏末葉各五錢片腦少許

冬月下廬身觸寒熱血溢生瘡頑滯不知痛痒

治宜內服升麻

和氣飲去大黃外用木香

煥郎

硫黃

吳萸

姜黃

射

香為末麻油調搽

凍瘡

是症先痒後痛狀後腫破出血黃水六止治宜用



雄黃雞臘一按搗爛黃蠟各等分清油減半同于慢火上熬成膏去渣塗之久久不愈者亦効 又方附子爲末麴調塗之或白及不拘多少爲末調敷

寒瘰手足拆裂作痛 治宜清油五錢慢火熬沸入黃蠟一塊再煎溶入鉛粉五倍子末各少許熬紫色爲度先以熱水泡手足火上烘乾後用藥敷以紙貼之其痛立止入水亦不落或桐油膏塗之亦妙

又方 每遇寒凍之時將石榴子內取汁塗其耳面手足自狀潤澤如女子面取石榴子汁調粉搽面更加艷色

手足皸 治宜先以百沸湯泡洗皮軟拭乾狀後用燥油二兩黃蠟一兩其膏勻敷之或用五倍子爲末牛骨髓調磁罐收貯埋地中七日取出填較中即愈或桐油調蜜化僧塗之九効 疥瘡 是痘如免癰瘡于日瘡一樣多生手足又名梅氣瘡

治宜以艾火初起的則餘者皆落神効

療瘡 是症因見生瘡中毒而痒而腫連眼微赤痒處搔之隨起

瘡症重者遍身如豆如杏膿麻作痛

治宜生蟹取黃隨瘡大小遍敷之或臘茶爲末麻油調搽或柳

葉煎湯洗之或磨鉄槽中泥塗之

竹木刺入肉不出 治宜霜梅陳煖肉佈乾時分搗爛罨或牛夕

根嚼爛塗之或頭垢或蛭蟻虫搗爛敷如出後肉爛以象牙爲末

針刺折在肉内瓜蒌搗爛敷一日換三次自出或用土内新南星

一個野芋三個雄磁石一錢同搗爛罨傷處自出神効

針炙致傷經絡出膿不止 治宜猪骨燒灰存性象牙珍珠血竭

各等分爲末將蠟作一條將一頭蘸藥末入窠内剪斷外截

炙火瘡水出不止 治宜炒黃連一兩石乳五錢爲末搗

火瘡瀉血 用舊貼過好膏藥燒灰敷 李先保

南京金文斗秘授黑髮烏鬚益腎延年強龜久戰奇方

黑豆五升揀去扁破用一大砂窩將烏骨老鷄一隻母的煮湯  
二大碗無灰老酒二大碗何首烏兩新青用竹刀切碎陳者用  
木槌打碎陳米兩早蓮草兩桑椹兩生地黃兩歸身兩故芷兩  
俱爲咬咀拌豆以酒湯爲水砂窩大依一料砂窩小作二料用  
文火煮豆以乾爲度去藥存豆取出掠去潮氣以磁罐盛之空  
心用淡鹽湯食豆一小合以其曾用雞湯煮過早晚宜慎干益  
藏以防蜈蚣也食完再製但自此後永可食雞肝服至半載髮  
鬚從內黑出目明如少且又能磨戰極妙

應員製烏鬚神方 用麻油烟鋤核桃蒲配射香元爲末大小竹

一倚盛埋冬青樹下七日化成水將水擦鬚上即黑

京前家兄傳烏鬚方 用五倍子打碎去灰用銅鍋炒成豆豉

黑髮將青皮一六片濃茶打濕先放地土將倍子包裏焙乾

餅要着火色莫炒過了秤過一錢紅銅末上好醋炒七次以爲度鋪過細末三分沒石子二分明凡一分食鹽二分上下分俱爲極細末用極濃好細茶調煎如餅面樣方好每用敷上以皮帛包過一夕後用核桃油染之

春方各通官春鴉片二錢蟾酥一錢丁香一錢硃砂五錢射干分

一右爲末以律調二三厘塗玉莖如晚行事必要末時調塗至晚臨行事時切要溫水洗去久戰不泄妙不可言

長思丹 公土狗一个火焙天龍即馬食虫地龍一條脚其

人龍一條脚其朝腦安金頭蜈蚣一條其爲末將蟾酥和丸如

粟豆大每用一丸施于玉莖上自朕堅大令美女長思

黑髮香頭油 用何首烏 墨斗草 白芷 細辛 甘松 三

奈 排草 生地黃 桑椹 側柏葉 紅豆 良姜 一黑

核桃肉 香油久浸極妙或芭蕉葉同膠 束蒸油擦

百病皆除 萬應膏 萬應膏 萬應膏

鬚髮脫落不生 用黑附子 蔓京子 柏子仁 蘇合末 烏雞  
脂和搗研乾置瓦合內封固一日取出塗在脫處如因頭落者  
先用生髮擦三次后用牛髮末麻油調搽

急救諸方

救繼死 自旦至暮但心下微溫雖一日以上可活急抱起死人

將繩寬解之不可割斷極須按定其心却撚正喉嚨放倒臥

令一人以手掌掩其口鼻兩人吹其兩耳一人急牽其髮不成

手及屈伸其手足摩將之少活即以粥飲與之此法救人神效

又法 男用雌雞女用雄雞冠刺血滴口中即活或細辛研香雄

黃等分吹入鼻中痰出即醒

溺死 先以刀拔開口放筋一根啣住使可出水然後解去其

一服以艾炙臍中令兩人以草管吹其耳即活或以生人到厥

人即負持走吐水即活外用綿裹鼻角未納取道中水出便

活肉以鴨血灌之

厥凍死 其症四肢強直口禁畧有微氣者且慢向火急用布盛熱灰放在心頭冷即換熱待眼開却用溫酒或米飲灌之冬月墮水凍死亦宜

救挾暑死 宜用溫湯常摩洗其心腹間如路途急切用路上土置腹臍間令人便尿于臍中即活不可用冷水冷之即死好男極腹痛卒沒死者即移陰處地上掘水孔將人尿撒在內撓起泥水塗臍

救墜死 墜下瘀血衝心欲絕者用豆豉濃煎湯服若便資氣絕不能言取葉不及急拔開口以熱小便灌之

接命方 或打死或吊死或喉風不醒人事或傷寒重結只用蘇靈仙一味研水瀉去渣服半盞即時出痰就活

中書

人遇事急智盡術窮或爲人所隔始白服毒或懷中其毒其脉洪

天者生微細者死又曰洪大而遲者生微細而數者死

天凡中信毒若干飲食中得者易治酒中得者難治若在胸腹脰

楚可吐急用胆凡斫水灌之即吐若在腹中可下後用黃丹

甘草 青黛 林硝 萊豆粉爲末以小鹽將水調下腹痛倍

黃丹豆粉并花水調下

解信石粉 治宜錫灰爲末冷水調服一二碗或羊血陰乾水調

服三五錢此方亦匠水粉山砒或猪母尿灌或胆凡爲末凉水

調七厘一服若吐出原藥水信石即愈不吐再服七厘但好從

忌鹽酒及熱物此方治山砒水粉

解山砒毒 治宜燕口青嫩葉葉一大握以手搥爛將甘草爲末

和爲丸菜豆煎湯吞下仍用下截根研冷水吃即吐如不退又

用木槿根皮研冷水吃即泄又方臭猪柴根南桐葉煨熟飲

解水粉毒

治宜肥皂去子搗爛菜豆粉為丸如梧子大滾水下

六七箇吐即愈或甘草菜豆粉各生明凡為末每水送下

方

以方

用黃連

研細末再用

臘月照牛胆仁將口

在碗內將黃連末拌勻復入胆內線縫口透風處陰乾不可見

日遇症急取胆內藥一錢井水調下兼收懸梁赴水氣未絕者

解川烏附子毒心煩燥悶甚則頭暈七肽通身皆黑勢危必死煎

萊豆或黑豆冷飲或防牛甘草煎湯冷服一切藥毒極危必死煎

心間煖者不妨朱子全集云緊急無藥令多汲新水灌下

解巴豆毒 令人大瀉或吐煩渴發熱急用黃連黃柏煎湯冷服

更以冷水浸手足掌忌食熱湯熱性藥物或黃連大豆蘆薈

解諸草毒 治誤食毒草并百物毒救人以必死板藍根四兩煎

衆青絲生甘草各一面為末蒸餅九梧子大另用青黛為衣如

查精神恍惚惡心即是誤中諸毒急取十五丸嚼爛新水送下



如牛夏毒以生姜解之

解豆府毒 過食令人生瘡暖氣遺精白濁用生蘿蔔煎湯服或干煎湯亦可

解諸菌毒 掘新地取真黃土以冷水於內搗之令濁澁少頃取飲之可解亦治極木菌食之令人笑不止 又用生荒花為末每一錢新汲水下以利為度菌之毒者蓋因蛇虫毒氣蒸所致

解諸毒 用南桐葉研水吃甘草研水吃灵芝搗研水吃生薑搗汁一碗吃或綠瓜葉汁服或萊菔搗水服

解鼠莽毒 用大黑豆煮汁服之如欲拭其驗先刈鼠莽苗葉以汁澆其根從敗爛不復生發矣

解鴉毒 即孔雀毛并胆也用干葛為末水調服 食鴉鴨中每以糯米泔濕服即消

二六畜肉毒 用犀角磨濃汁一碗服之 如食牛馬肉生毒

菰一兩黃豆 合葱頭一兩生酒三碗煎服汗出即愈  
食自死六畜毒 始末一二錢服不解再服

解河豚魚毒 一時困怠殺人急用清油吐出或服槐花末龍腦末皆可至宝丹尤妙諸魚毒橄欖解之如服河豚子作豚用蜜內藥水灌之或芦根水尤妙

解鱗鱉蝦蟆毒 用生豆豉一合新汲水半碗浸汁頻服即愈此三物令小便閉臍下脹痛有致死者

解斑蝥毒 其証吐逆不止急用菜豆或烏豆或糯米煎湯服一方用澤蘭葉搗汁服或乾者爲末白湯下

解中金蠶蟲毒 絳竟中毒宜先吮白凡味甘而不瘥次嚼黑豆不瘥者是也用石榴根皮煎濃汁飲之即吐出活虫無不瘥者

解石蟹中毒 紫蘇濃煮汁飲三盃

解中諸物毒 白凡細茶等分爲末每三錢新汲水調服得吐即

勿不吐再服或萬病解毒丹丸下之

誤吞諸物

誤吞銅鐵碗瓦 萬病解毒丸大黃大戟連喬寒水石略二白玉

簪白芷黃芩茯苓石管滑石天花粉略三封藎薄荷干葛略四

山慈姑附貫衆仁正青無錫瓦末葶豆粉糊為丸彈子大每服

一丸薄荷磨下 治一切中毒能化銅鐵碗瓦同嚼化為粉碎

此其驗也抑論中毒之症辨其被毒何物之中審其遠近久

則不救治法上宜吐之以錫湯探吐急以桐油灌吐之下以解

毒丸散漿利之中毒手足面青過時者不救緊急只以玄明粉

煎甘草利之亦可

誤吞鉄針 用蚕豆煮熟同韭菜汁吞下針與菜從大便而出

用熟艾煮汁濃飲便解

誤吞銅錢 不能化者用砂仁煎濃汁飲之其銅自下或用李

研爛服之其銅自化或用堅炭為末米飲調服于大便中過

如烏枚狀或桑柴炭細研米飲調下二錢

誤吞金銀等物 飴糖一片漸以食盡遂出或用石灰一盞炒

疏黃一皂角子大同研末酒調服

誤吞禾芒刺喉 治宜搗口涎灌之

誤吞蜈蚣一用生清血令病人吃須臾生清油灌口中惡心其蜈

蚣衮在血中吐出繼以雄黃末水調服一人醉酒困地蜈蚣入

喉用生雄雞血調冷水灌入立時吐出

誤吞水蛭 入服經久必生小蛭能食人肝血腹痛不可忍面目

黃瘦全不進食若不早治能令人死用田中乾泥一小塊小死

魚三四箇將豬脂擦撓勻用巴豆十枚研爛入泥內為丸莖菜

大用田中冷水吞下十九小兒三五丸須臾大小水

下却以四物湯加黃芪煎服生血補脾

誤吞田螺 嚥喉不下死在須臾用腸乙隻以水灌入口中少頃將鴨倒懸令吐出涎水與患人服之其螺即化

骨鯁

神仙爲骨丹行通庵傳其骨自隨藥帶下或出如神

朱砂錢丁香錢血竭紅磁石銀龍骨銀各共爲末黃蠟炙爲丸

朱砂爲衣每服一九香油煎好醋吞下如要吐用矮荷煎好醋

吃後用濃茶任服如無矮荷桐油代之又方用矮荷煎好醋

存性吹入喉中立刻一力用礪砂一塊嚥之骨自入指甲燒

金鳳花子研爛嚥下無子用根亦可

又治雞魚等骨插入喉中仙方用斬蛇劍刺喉從喉中送

飲物三指間創此下來臨時搗爛爲丸如黃豆大每用溫水送

下一丸不下再服一九以下爲度甚重者不過十九

諸骨鯁神符 但已下字無俱不用勻

此碗化爲東洋大海咽喉化爲萬丈龍潭九龍歸洞吾寧

大上者君急七如律令勒吸東方生炁三口吹入碗中每行

法面朝東用淨水大半碗放桌上左手執拳在胸前右手執  
法于碗上書前符字燒假如魚骨鏹就書上龜字除  
勿書可書下八符餘皆倣此

蟲獸傷

凡青夏初交大多發狂但見其尾直下不捲口中流涎舌黑者  
是癩狗若被所傷不可視爲平常乃九死一生之患急用針刺去  
血以小便洗刮令淨以核桃殼半邊以人糞填滿掩其瘡孔看  
于殼上灸之殼焦盡乾則易之灸至百壯次日又灸百壯灸至三  
五百壯爲佳灸後用生南星防非等分爲末再以口噙漿水洗  
傷處用綿拭乾搽之更不作膿其內煩服後藥以徹其毒可也

只就咬處牙跡上灸之一日灸三壯灸至二百二十日乃止  
食炙韭菜永不再發亦良法也

百病源散 治癩狗咬

斑猫七箇去頭翅足為末溫酒調服于小便桶內見衣珠似  
形為効如無再瀆七次無狗形亦不再發後用益元散一兩  
煎服解之忌飲酒食猪肉雞魚油膩百日終身忌食大肉凡  
此患依前針洗艾炙更服此藥無不愈者

扶危散 治癩狗咬

蟾蜍七箇化明礬七箇雄黃化明礬七箇雄黃化明礬七箇雄黃化明礬七箇  
飲下或從大小便出或吐出毒即愈以傷處去三寸  
求不再發

應真製癩狗咬傷神效 用糯米一勾斑猫七箇炒出

主斑蝥只用毒為末以香油凡點同調冷水以出毒為要

不利再服若毒八腹中作痛以黃連煎湯雄黃為末調服

如虛兄傳常大傷方每宜水洗去血用刀刮膏瓶上錫按口止

或薑汁滴咬處或馬全子磨乳制神効

治狗咬神法用微墨濃磨筆蘸書吾勅令二尾火虎從此與

九字念三遍寫三遍于咬處即愈

治蛇咬宜急用麻繩或頭髮繫縛在上面莫令毒氣奔上則

勉強飽食隨用雞蛋破些白放咬處引出毒氣其蛋白隨黑若

再不愈又換必至蛋白不黑方止又用土烏藥葉生搗酒溫熬

醉服又用嫩葉葉搗爛酒炆吃以醉為度其渣以貼患處若咬

一二口毒傳經絡用新艾鋪咬處炙之俟其痛止再無後患

同生酒月荷江傳治毒蛇所傷致死

托板歸不拘多少其毒四五月生至九月月早毒即散藥右取

小兒生至九月月早毒即散藥右取



一 爛用典生酒調服隨量飲之卽瘡貼患處立愈治火

二 海上方 治蛇咬 絲瓜根洗淨搗研生酒吃一醉立愈 又方用半邊蓮研酒服

治蛇傷神法 一進門論云本師在前祖師在後三元將軍不離

左右五昌將軍不離前後又化爲西天羅漢連念頭顱足是頭

二下頓開一十八重地獄一禁蛇頭二禁蛇嘴連將金鎖訣將

即畜生金鎖上鎖蛇頭銅鎖上蛇腰下廉云即立西東下

旁水一盞架與傷處于吐深針蛇咬口邊併指了遂念起眼望

西天羅漢獅子在前一閑獅子在前二閑獅子在後三閑獅

子在兩傍畜生你氣不行我氣先行傳授法度師爺莫誤弟子

誤了弟子由尙司誤了後代無人傳遂將劍訣着力削去毒水

口論金劍銀劍蛇毒盡不見金削銀削蛇毒遂永滅

痛不可忍宜用曰凡生夏各等分爲末醋調塗之

雄黃 蟾酥 胆礬 半夏 冬等分 射香 少許

右為末用貓兒草搗汁和為丸用口吮痛處令淨用丸藥拍遍

○二神散

周東泉傳

治蝎螫

肥杏仁七枚白口嚼為泥塗

治蝎螫法

每年除夜左手搜起前裙右手挑三尺長棍向門指

上敲三下念呪云蝎七螫七不向梁上走却來這裏螫敲上

節呪畢吹氣一口吹于杖頭後吸其氣吹于挑杖手心如此三

次即已遇有蝎螫以手摩之即不痛可用一年法為否則不驗

治虎咬

先以清油一碗次用油洗痛處或白丸為末細傷處痛

止立刻或用砂糖水調塗併服一二碗或二角楓紅肉消忍冬

藤嫩搗葉鵝掌葉嫩松毛七狗脊臭桐葉霹靂葉嫩水燂後洗

治馬咬

及踏傷人用艾炙合并腫處或用人尿或馬屎燒灰為

末皆可敷之

治鼠咬

貓毛燒灰人射香沙

許津液調敷或貓糞咬

治蜈蚣咬

用雞屎塗之

一方用蜘蛛吸于其毒待蜘蛛醉

死忍用以蜘蛛按冷水中免傷其命或野麥葉久搽或野芋葉

搽野雞蘇葉擦或雄黃酒吞內服外敷

治蜘蛛咬

用醋磨灶鐵汁或桑白皮汁塗之亦治蜈蚣咬或

油燃灯吹滅以余烟拌之或山豆根和醋塗之

治壁虎咬

毒人必死用桑柴燒灰以水煎三四沸瀉清汁調白

九末塗傷處兼蛇咬口

治黃蜂螫

用熱油洗之清油抹之亦可或用頭垢敷或用鹽搽

或醋磨雄黃塗之

治入脚虫傷

其虫隱于壁間以屎射人遍身生瘡加湯火燄

鳥雞骨燒灰爲末雞子清調城數

治溪毒

兼避射工夏月出行取知母爲末自磨欲人水時

兼避射工夏月出行取知母爲末自磨欲人水時

兼避射工夏月出行取知母爲末自磨欲人水時

兼避射工夏月出行取知母爲末自磨欲人水時

兼避射工夏月出行取知母爲末自磨欲人水時

許投上流亦取服之 一方用葶耳子鷄汁服之

治蛇蝎毒 用鷄屎塗之 又方急煎鹽湯洗浸腫處即消或蟬脫四

箇煎水洗再用荊利短過爲末口涎調敷

人咬傷 用龜板或蟹甲燒灰爲末用香油調塗

夏月諸般損傷蛆蠅極盛臭惡難當 外用塞水石末敷貼蟬脫青黛

洛五分 蛇退一兩燒 蘇陰細辛一分 共爲末每黃酒送下三錢蚰皆

水化而出蠅亦不近其效如神

藏身仙法 水一碗將自己生年月用劍藏招寫入水碗內口念言不

言月不月此是玉皇真口訣後書三字號蓋水碗上 齋 齋 齋

寫七適用金脚決蓋上此水碗置家靜處 八病門時口暗念 吾

身不是非九身吾是北方鎮天真武拔髮伏劍脚踏龜蛇黑雲顯七

蓋吾身神不見吾身鬼不見吾形若見吾形室刀寸斬不可停急如  
祖師律令勅念完將祖師骸放下或將真阿彌一塊藏身中或用  
雄黃塞鼻中亦可

新刻大醫院百效全書六卷終